

Spastyna Max, 80 mg, tabletki, 2 tabletek

Cena: 16,66 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Rozkurczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Spastyna Max to środek rozkurczowy, stosowany w przypadku skurczów o podłożu nerwowym i mięśniowym. Substancją aktywną zawartą w leku jest chlorowodorek drotaweryny.

Wskazania

Spastyna Max stosuje się w:

- stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater;
- stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz;

oraz wspomagająco:

- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
- w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

Działanie

Drotaweryna jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia nerwowego i mięśniowego, które często objawiają się bólem w jamie brzusznej. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe).

Dawkowanie



- Dorośli: dawka dobową wynosi 120-240 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową wynosi 240 mg drotaweryny (3 tabletki).
- Dzieci powyżej 12 lat: dawka dobową wynosi 160 mg w 2 - 4 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobową wynosi 160 mg.

Skład

- Substancją czynną leku jest chlorowodorek drotaweryny.
- 1 tabletka zawiera 80 mg chlorowodoru drotaweryny.
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, powidon K 30, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca,
- jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia,
- u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- nudności, zaparcie,
- ból głowy, zawroty głowy,
- bezsenność,
- kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi,
- reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd).

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław