

Steper pro, 10 mg/g, krem, 15 g

Cena: 30,33 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	STEPER
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Grzybica
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis
Steper Pro to krem o wszechstronnym działaniu przeciwgrzybiczym, zaliczany do kategorii produktów leczniczych.

Wskazania
Steper pro stosowany jest w grzybicach skóry i łupieżu rumieniowatym.

Działanie
Substancja czynna leku Steper pro ma działanie grzybobójcze na dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów.

Dawkowanie
Dorośli: należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem, przed snem. Należy nanieść cienką warstwę leku na obszar objęty zmianami chorobowymi i delikatnie wmasować. Leczenie lekiem Steper pro należy prowadzić przez odpowiednio długi okres.

Skład

- Substancja czynna leku jest bifonazol (bifonazolum)
- 1 gram kremu zawiera 10 mg bifonazolu.
- Substancje pomocnicze to: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetyl palmitynian, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, olejek eteryczny z mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, woda oczyszczona

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Steper pro jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną leku lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
Częstość występowania nieznana:

- ból w miejscu podania;
- obrzęk obrzeżny w miejscu podania;
- kontaktowe zapalenie skóry; alergiczne zapalenie skóry;
- miejscowe zaczerwienienie skóry;
- świąd;
- wysypka;
- pokrzywka;
- pęcherzyki;
- łuszczenie skóry;
- wyprysk;
- suchość skóry;
- podrażnienie skóry;
- rozmiękanie skóry pod wpływem działania leku;
- uczucie pieczenia na skórze.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania Steper pro, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne leki przeciwgrzybicze np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol, powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol.
- Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami.
- Nie połykać.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
aflofarm@aflofarm.pl

Galeria

