

Stoperan Lek przeciwbiegunkowy 8 sztuk

Cena: 12,78 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	STOPERAN
Opakowanie	8 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Biegunka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Stoperan to lek dostępny w postaci kapsułek twardych przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Jego główną substancją czynną jest loperamid, który działa poprzez łączenie się z receptorami na powierzchni jelita. To prowadzi do spowolnienia perystaltyki jelit, zmniejszenia częstości i ilości wypróżnień oraz zwiększenia wchłaniania wody z jelita grubego. W rezultacie konsystencja stolca ulega poprawie, a ryzyko odwodnienia zostaje zmniejszone.

Lek Stoperan jest stosowany w leczeniu objawowym zarówno ostrej, jak i przewlekłej biegunki.

Wskazania

Lek Stoperan stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki.

Działanie

Przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

- Biegunka ostra: pierwsza dawka 2 kapsułki (4 mg), a następnie 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 kapsułek (16 mg) na dobę.

- Biegunka przewlekła: początkowo 1 kapsułka (2 mg) 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4-6 kapsułek (8-12 mg) na dobę.

Dzieci w wieku od 9 do 12 lat:

- Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.

Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.

- Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.

Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 8 lat:

- Biegunka ostra: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.

Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki (6 mg) na dobę.

- Biegunka przewlekła: 1 kapsułka (2 mg) po każdym luźnym wypróżnieniu.

Nie należy stosować dawki większej niż 2 kapsułki (4 mg) na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: loperamidu chlorowodorek 2 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, erytrozyna (E 127), błękit patentowy (E 131), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Stoperan?

- jeśli pacjent ma uczulenie na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w stanach, w których niepożądane jest spowalnianie perystaltyki jelit z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej i toksycznego rozszerzenia okrężnicy,
- stosowanie leku Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit,
- w niedrożności jelit, ostrym wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, ostrym rzucie krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniastym zapaleniu jelit, zwłaszcza związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania,
- w bakteryjnym zapaleniu jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,

w ostrej czerwonce z krwią w kale i przebiegającej z podwyższoną temperaturą ciała.

Działania niepożądane

- bóle i zawroty głowy, zmęczenie, senność;
- ból brzucha, zaparcia, nudności i wymioty, niedrożność jelit, rozszerzenie okrężnicy, w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność, suchość w jamie ustnej;
- wysypka, pokrzywka i świąd, obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczno-rozplywna naskórka;
- reakcje alergiczne, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny;
- zatrzymanie moczu.

Ostrzeżenia

- U pacjentów, u których występuje gorączka oraz krew w kale, przed rozpoczęciem podawania loperamidu należy ustalić przyczynę biegunki. Należy zachować ostrożność stosując Stoperan w biegunce bakteryjnej.
- U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość toksycznego działania leku na ośrodkowy układ nerwowy.
- U pacjentów przyjmujących zbyt duże leku (przekraczające podane dawkowanie) notowano występowanie ciężkich zaburzeń



pracy serca (m.in. przyspieszony lub nieregularny rytm serca).

- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław