

Strepsils Intensive, 8,75 mg, tabletki do ssania, 24 tabletek

Cena: 52,63 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	STREPSILS
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki do ssania
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące, Przeciwbólowe, Przeciwwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Strepsils Intensive to tabletki do ssania stosowane przy bólu gardła, działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Zawierają flurbiprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Już po dwóch minutach od zażycia powlekają i łagodzą dolegliwości związane z infekcją gardła. Działanie leku utrzymuje się do 4 godzin. Przeznaczone są do doraźnego stosowania u dzieci powyżej 12. roku życia oraz u dorosłych.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania tabletek do ssania Strepsils Intensive jest krótkotrwałe leczenie objawów bólu gardła u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Działanie

Strepsils Intensive działa silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Tabletki do ssania zawierają flurbiprofen, należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a działanie terapeutyczne rozpoczyna się już od drugiej minuty i utrzymuje się do 4 godzin od zastosowania. Strepsils Intensive powleka oraz łagodzi.

Dawkowanie

Lek należy stosować doustnie, tabletki należy ssać powoli, zmieniając ich położenie w jamie ustnej, aby zapobiec miejscowemu podrażnieniu. Strepsils Intensive jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia, więc bez konsultacji nie stosować dłużej niż 3 dni. Zalecane dawkowanie Strepsils Intensive to 1 tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową to 5 tabletek do ssania.

Skład

- Substancją czynną leku jest flurbiprofen.
- 1 tabletkę do ssania zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.
- Substancje pomocnicze: makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy, miód.

Przeciwwskazania

Nie stosować Strepisils Intensive u osób z nadwrażliwością na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek składnik tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: występowanie kiedykolwiek objawów alergii na kwas acetylosalicylowy, inne NLPZ; istniejąca lub przebyta chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkie zapalenie jelita grubego; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 lub więcej na 10 osób): zaburzenia smaku
- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): zawroty głowy, ból głowy, parestezja, podrażnienie gardła, biegunka, owrzodzenie jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje w jamie ustnej, ból gardła, ból brzucha, kserostomia.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): bezsenność, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła, wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, bolesność języka, wymioty, wysypka, świąd.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): zaburzenia krwi, nadwrażliwość, szok anafilaktyczny, niewydolność serca, obrzęk, niewydolność nerek, niewydolność wątroby.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): trombocytopenia, neuropenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka.
- Częstość nieznana: nadciśnienie, krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego, rumień wielopostaciowy, gorączka, zapalenie wątroby, bezsenność.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

- choruje lub chorował na astmę lub alergię,
- przyjmuje jakiegokolwiek inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub kwas acetylosalicylowy,
- jest w podeszłym wieku - prawdopodobnie może być bardziej podatny na działania niepożądane,
- cierpi na toczeń rumieniowaty układowy i mieszaną chorobę tkanki łącznej,
- przechodzi zapalenie migdałków lub może mieć zakażenie bakteryjne gardła,
- cierpi na: chorobę serca, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego, niewydolność serca, podwyższone ciśnienie krwi, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę,

zwiększony poziom cholesterolu we krwi, długotrwałe bóle głowy, jest po udarze mózgu,

- pali tytoń,
- jest w I lub II trymestrze ciąży.

Producent

RECKITT BECKINSER POLAND SP. Z O.O.
ul.Okunin 1
Nowy Dwór Mazowiecki
ConsumerHealth_PL@reckitt.com