

Strepsils na kaszel 375 mg, 20 kapsułek twardych



Cena: 36,59 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	STREPSILS
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki twarde
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Strepsils na kaszel 375 mg to lek w formie twardych żelatynowych kapsułek, zawierający karbocysteinę, substancję czynną z grupy mukolityków. Karbocysteina zmniejsza lepkość śluzu, co ułatwia jego odkrztuszanie. Lek Strepsils jest przeznaczony do stosowania w chorobach górnych dróg oddechowych, które charakteryzują się nadmierną produkcją śluzu. Kapsułki Strepsils na kaszel są pakowane w blistry z folii, umieszczone w tekturowym pudełku, przy czym każdy blister zawiera 10 kapsułek.

Wskazania

Lek Strepsils na kaszel 375 mg stosuje się w przypadku:

- chorobach dróg oddechowych, gdy wytwarzana jest zbyt duża ilość wydzieliny śluzowej lub wydzielina jest zbyt lepka.

Działanie

Zmniejszenie lepkości śluzu i ułatwianie odkrztuszania.

Dawkowanie

Dorośli: 2 kapsułki 3 razy na dobę.

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancję czynną: karbocysteina 375 mg,
- zawartość kapsułki: mannitol, skrobia kukurydziana, kroscarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan klasy K12, krzemionka koloidalna bezwodna oraz magnezu stearynian,
- otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171) oraz żelaza tlenek żółty (E172).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent ma wrzody żołądka lub jelit.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać przyjmowanie leku Strepsils na kaszel i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala, gdy:

- wystąpi reakcja alergiczna, objawy mogą obejmować: wysypkę, problemy z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka,
- na skórze pojawią się pęcherze lub wystąpi krwawienie ze skóry, co obejmuje również okolice warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych,
- mogą wystąpić również objawy podobne do grypy i gorączka. Może to być tak zwany „zespół Stevensa-Johnsona”,
- w wymiocinach pacjenta widoczna jest krew lub pacjent wydziela czarne, smoliste stolce.

Ostrzeżenia

- Ze szczególną ostrożnością należy stosować Strepsils na kaszel u osób w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz osób stosujących leki, które mogą powodować krwawienia z przewodu pokarmowego.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECKITT BENCKISER