

Sudafed, 60 mg, tabletki powlekane, 12 tabletek

Cena: 29,44 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD.
Przeznaczenie	Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Sudafed to lek stosowany w celu złagodzenia obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa, szczególnie przy jego niedrożności oraz problemach z zatokami przynosowymi. Preparat ten jest zalecany w terapii objawowej kataru i zatkanego nosa, pomagając przywrócić swobodne oddychanie.

Wskazania

Leczenie objawowe w zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu:

- przeziębienia,
- grypy,
- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Działanie

Sudafed zawiera pseudoefedrynę w postaci chlorowodoru, która zmniejsza przekrwienie błony śluzowej górnych dróg oddechowych, zwężając błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Efektem tego jest zmniejszenie ilości wydzieliny i obrzęku oraz udrożnienie nosa. Pseudoefedryna oddziałuje na naczynia krwionośne, wywołując skurcz naczyń.

Dawkowanie

- Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 tabletkę, zwykle 3-4 razy dziennie. U młodzieży stosowanie leku powinno ograniczyć się do 4 dni.
- Osoby w podeszłym wieku: schemat dawkowania nie zmienia się - pozostaje taki jak dla osób dorosłych. Należy wziąć pod uwagę czynność wątroby i nerek.

Skład

- Substancją czynną jest: pseudoefedryna (Pseudoephedrini hydrochloridum).

- 1 tabletka powlekana zawiera 60 mg chlorowodoru pseudoefedryny.
- Substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokryształiczna, żelowana skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian; skład otoczki Opadry OY-S-9473: żelaza tlenek czerwony, hypromeloza, talk, makrogol 400.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sudafed:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną - pseudoefedrynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wieńcowa lub ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- jeśli pacjent przyjmuje lub w ostatnich 14 dniach przyjmował inhibitory MAO (leki stosowane w depresji),
- w przypadku przyjmowania furazolidonu.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- nerwowość, bezsenność,
- zawroty głowy,
- nudności,
- suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zaburzona praca serca, przyspieszenie akcji serca, kołatanie serca,
- wysypka, zmiany krostkowe, świąd, któremu może towarzyszyć rumień, gorączka,
- wzrost ciśnienia krwi,
- ból głowy, wzmożona aktywność psychoruchowa, senność,
- euforia, niepokój,
- wymioty,
- bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli u pacjenta występują: nadciśnienie tętnicze, choroba serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, rozrost gruczołu krokowego, zaburzona czynność wątroby i/lub nerek.
- W przypadku gdy objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy unikać łączenia pseudoefedryny z alkoholem.
- Lek zawiera laktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić od wilgoci.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght
Dublin 24, Irlandia

Galeria

