

Sudafed Xylospray HA Aerozol do nosa 10 ml



Cena: 29,77 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Część ciała | Nos |
| Dla kogo | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | SUDAFED |
| Opakowanie | 10 ml |
| Postać | Aerozol |
| Producent | MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LTD. |
| Przeznaczenie | Alergia, Katar, Uczulenie |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat |

Opis produktu

Opis

Sudafed XyloSpray HA to lek obkurczający naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa. Jego działanie zwykle występuje w ciągu 5-10 minut od podania, co przyczynia się do ulgi w objawach. Dzięki zmniejszeniu obrzęku, ułatwiony zostaje odpływ wydzieliny, co w efekcie ułatwia oddychanie.

Ważnym składnikiem tego leku jest kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa. Obecność tego składnika jest korzystna dla komfortu pacjenta i może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego nawilżenia błony śluzowej.

Sudafed XyloSpray HA jest dostępny w postaci sprayu, co ułatwia jego stosowanie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 6 lat. Jego przyjazny skład, pozbawiony konserwantów, zmniejsza ryzyko podrażnienia błony śluzowej nosa.

Wskazania

- Lek stosuje się przy nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej (występującym przy przeziębieniu, grypie, katarze siennym oraz w alergicznym nieżycie nosa).
- W zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem.

Działanie

Obkurczenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: stosuje się jedną dawkę do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera

- substancję czynną: ksylometazoliny chlorowodorek 1 mg,
- pozostałe składniki: sodu hialuronian, sorbitol, glicerol, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Sudafed XyloSpray HA nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

- U pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu, ponieważ może to spowodować wystąpienie działań niepożądanych lub reakcji alergicznych.
- U pacjentów z suchym zanikowym zapaleniem błony śluzowej nosa, ponieważ preparat działa obkurczająco na naczynia krwionośne i może zaostrzyć objawy tego schorzenia.
- Nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia, ze względu na brak ustalonych bezpieczeństwa i skuteczności u tej grupy wiekowej.
- Nie powinien być stosowany u pacjentów po usunięciu przysadki mózgowej lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odstąpieniem opony twardej, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.

Działania niepożądane

- objawy podrażnienia (pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa),
- kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych,
- po odstawieniu leku może dochodzić do nasilenia obrzęku błony śluzowej (przekrwienia reaktywnego).

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

- Lek nie zawiera środków konserwujących.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.