

# Supremin Max 15 mg/ml Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 150 ml



Cena: 34,01 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SUPREMIN
Opakowanie	1 butelka 150ml
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Przewlekłe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 3 lat

## Opis produktu

### Opis

**Supremin MAX** to nieopioidowy syrop przeciwkaszlowy o klarownej konsystencji i pomarańczowym smaku oraz aromacie. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 3. roku życia, młodzieży oraz dorosłych w celu objawowego leczenia ostrego, suchego kaszlu. Jego substancją czynną jest butamirat cytrynian, który działa poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Syrop Supremin Max jest dostępny w opakowaniu zawierającym 150 ml produktu. Aby ułatwić dawkowanie, w opakowaniu znajduje się dołączona miarka dozująca z czytelną podziałką.

### Wskazania

Objawowe leczenie ostrego, suchego kaszlu.

### Działanie

Przeciwkaszlowe.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę.
- Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

### Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: 1,5 mg butamiratu cytrynianu,
- substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E 211), sorbitol ciekły, niekryształizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny (zawiera etanol), kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Supremin MAX:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - cytrynian butamiratu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego,
- u kobiet w I trymestrze ciąży.

#### Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane: nudności, biegunka, pokrzywka, zawroty głowy, senność.

#### Ostrzeżenia

- Lek zawiera sorbitol - stosowanie tego leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Ze względu na zawartość sorbitolu, lek może mieć łagodne działanie przeczyszczające.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

#### Producent

POLFARMEX  
Józefów 9  
Kutno

#### Galeria

