

Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml

Cena: 18,46 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SYMPHAR
Opakowanie	50 ampułek po 5 ml
Postać	Roztwór
Producent	SYMPHAR SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Symphar fizjologiczny roztwór chlorku sodu o stężeniu 0,9% to wyrób medyczny przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Produkt jest dostępny w sterylnych, jednorazowych ampułkach o pojemności 5 ml. Roztwór Symphar nie zawiera konserwantów.

Składniki

Chlorek sodu 0,9 g, woda oczyszczona w ilości wystarczającej do 100 ml.

Zastosowanie

Produkt odpowiedni dla niemowląt, dzieci i dorosłych do:

- higieny oczu, uszu, nosa,
- przemywania ran,
- inhalacji w terapii aerozolowej.

Sposób użycia

- Higiena nosa i oczu: można dokonywać od 1 do 6 zabiegów oczyszczania dziennie, według potrzeb.

Zakrapianie lub przemywanie niedrożnego nosa: odchyl głowę do tyłu, ostrożnie wprowadź końcówkę ampułki jednorazowej i lekko naciśnij. Powtórz czynność do drugiego nozdrza. Przechyl głowę do przodu, żeby wydzielina mogła spłynąć i wytrzyj jej nadmiar. Przez 10 minut unikaj gwałtownego wydmuchiwanie nosa. U niemowląt zakrapianie należy wykonywać przy użyciu minimalnego nacisku, aby uniknąć ryzyka zakażenia ucha środkowego.

Zakrapianie, płukanie lub przemywanie oczu: wyciśnij kilka kropli roztworu do każdego oka. Wytrzyj nadmiar płynu sterylnym wacikiem. Unikaj kontaktu ampułki z powierzchnią oka.

- Higiena uszu: płukanie uszu po użyciu roztworu środka powierzchniowo czynnego do uszu, by usunąć rozpuszczone osady woskowiny i wypłukać zewnętrzny kanał uszny. Pojedynczej ampułki możesz użyć do obu uszu. Wytrzyj nadmiar płynu wacikiem.
- Przemywanie ran: zużywając całą jednorazową ampułkę roztworu, opłucz ranę. Wytrzyj nadmiar płynu tylko ze zdrowej części skóry. Unikaj kontaktu z powierzchnią rany.
- Inhalacja w terapii aerozolowej:

jako roztwór do inhalacji w terapii aerozolowej: zapoznaj się z instrukcjami podanymi na produkcie do inhalacji.

jako roztwór stosowany samodzielnie: zapoznaj się z instrukcjami podanymi na urządzeniu do terapii aerozolowej.

Ostrzeżenia

- Produkt nie zawiera konserwantów. Ponowne użycie tego samego produktu może wiązać się z ryzykiem roztworu zanieczyszczonego.
- Po otwarciu: należy natychmiast użyć i wyrzucić ampułkę jednorazową po użyciu.
- Nie używać tej samej ampułki jednorazowej do różnych zastosowań.
- Nieprzeznaczony do iniekcji.
- Nie używać po terminie zdatności do użycia.
- Nie używać, jeśli ampułka jednorazowa jest uszkodzona.
- Nie dopuszczać do kontaktu pomiędzy ampułką jednorazową i oczami lub powierzchnią rany.
- Otwarta ampułka jednorazowa nie może być ponownie użyta.
- W przypadku pierwszego użycia roztworu do inhalacji w terapii aerozolowej lub nadwrażliwości dróg oddechowych należy zasięgnąć porady swojego lekarza.

Ważne wskazówki

- Do jednorazowego i osobistego użycia.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli stosowany jest inny produkt do oczu, zacząć od podania NaCl Symphar 0,9%, następnie odczekać 15 minut przed podaniem kolejnego produktu.
- Roztworu mogą używać także osoby noszące soczewki kontaktowe.

Producent

Laboratoire Unither
Espace Industriel Nord
151, Rue André Durouchez, CS 28028
80084 Amiens Cedex 2
Francja