

Syrop tymiankowy złożony, 125 g



Cena: 10,71 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HERBAPOL
Opakowanie	125 g
Postać	Syrop
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Syrop tymiankowy złożony **Herbapol (125 g)** to dostępny bez recepty lek o działaniu wykrztuśnym, przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Ten tradycyjny produkt leczniczy jest stosowany w przypadku kaszlu towarzyszącego nieżytom górnych dróg oddechowych. Zawiera płynny wyciąg tymiankowy i tymol. Lek ma postać ciemnobrunatnej, przezroczystej cieczy o zapachu tymianku i jest dostępny w butelce z barwnego szkła z plastikową zakrętką, umieszczonej w tekturowym pudełku.

Wskazania

Syrop tymiankowy złożony (Thymi sirupus compositus) stosuje się tradycyjnie jako lek wykrztuśny w:

- kaszlu towarzyszącym nieżytowi górnych dróg oddechowych.

Działanie

Wykrztuśne.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 2 łyżeczki (10 ml), 3 razy dziennie.
- Dzieci od 6. do 12. roku życia: 1 łyżeczka (5 ml), 3 razy dziennie.

Skład

100 g syropu tymiankowego złożonego zawiera:

- substancje czynne: wyciąg tymiankowy płynny 1:2 (Thymi extractum fluidum) 15 g etanol ok. 38% (v/v), tymol (Thymolum) – 0,01 g,

- substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy, etanol, syrop prosty (sacharoza i woda oczyszczona).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub któryś z pozostałych składników leku.
- Nie należy stosować preparatu w astmie.
- Nie podawać dzieciom z ostrymi stanami zapalnymi krtani i tchawicy w wywiadzie.

Działania niepożądane

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- objawy podrażnienia żołądka (nudności, wymioty).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- reakcje nadwrażliwości,
- łagodne dolegliwości przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia

- 10 ml syropu zawiera do 0,64 g (640 mg) etanolu, czyli tyle, co w ok. 5 ml wina lub ok. 13 ml piwa.
- Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli w trakcie stosowania leku wystąpi wysoka gorączka, duszności lub ropna plwocina.
- Syrop zawiera sacharozę. Przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji na niektóre cukry.
- Jeżeli mimo stosowania leku objawy nie ustąpią po 7. dniach lub ulegną pogorszeniu należy zwrócić się o poradę do lekarza.

Producent

HERBAPOL WROCŁAW