

Tabcin Trend, kapsułki miękkie, 24 kapsułki

Cena: 60,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	24 kapsułki
Postać	Kapsułki miękkie
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabcin Trend w formie kapsułek miękkich to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz udrażniającym nos. Zawiera trzy składniki aktywne, które wzajemnie się uzupełniają w walce z objawami grypy i przeziębienia, takimi jak gorączka, katar, ból głowy, oraz obrzęk błony śluzowej nosa i zatok. Tabcin Trend jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 15. roku życia.

Działanie

Tabcin Trend działa trójkierunkowo. Paracetamol odpowiada za zmniejszenie gorączki i bólu, a chlorfenyramina łagodzi katar i kichanie. Trzecia substancja czynna, czyli pseudoefedryna zwęża naczynia krwionośne i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa oraz zatok, ułatwiając oddychanie.

Dawkowanie

Dawkowanie Tabcin Trend u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat to 2 kapsułki. W razie konieczności powyższą dawkę można powtarzać lecz nie częściej niż co 4 godziny ani nie więcej niż 3 razy w ciągu doby.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamolu (Paracetamolium), pseudoefedryny chlorowodoru (Pseudoephedrine hydrochloridum) i chlorfenyraminy maleinianu (Chlorpheniramine maleas).
- Substancje pomocnicze: glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona, powidon K30; skład otoczki: sorbitol 70%, glicerol 85%, żelatyna, czerwien koszenilowa A (E124), błękit brylantowy FCF (E 133), szelak, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy; skład tuszu: tytanu dwutlenek, szelak zmodyfikowany, alkohol N-butylový, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy.

Przeciwwskazania

Nie stosować Tabcinu Trend u osób uczulonych na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są również: choroba układu oddechowego; jaskra, przerost prostaty, choroba serca, nadciśnienie, cukrzyca lub nadczynność tarczycy; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; ciężka niewydolność wątroby, nerek.

Działania niepożądane

Natychmiast należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

- reakcji uczuleniowych (rzadko opisywano), takich jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy (obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy), zwiększona potliwość, nudności, spadek ciśnienia tętniczego lub wstrząs,
- trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli), u pacjentów z uczuleniem na leki przeciwbólowe i przeciwreumatyczne, np. kwas acetylosalicylowy lub inne niesterydowe leki przeciwzapalne może czasami dochodzić do nasilenia się objawów astmy („astma analgetyczna”),
- wysypki skórnej lub ciężkiej reakcji skórnej (w przypadku paracetamolu występujące bardzo rzadko, czyli rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): ostra uogólniona osutka krostkowa – AGEP, ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (w przypadku pseudoefedryny występujące z częstością nieznaną), objawiająca się nagłą gorączką, zaczerwienieniem skóry lub licznymi niewielkimi krostkami, które mogą wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni stosowania leku Tabcin Trend; zespół Stevensa-Johnsona objawiający się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi; toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (może być śmiertelne) objawiające się pękającymi olbrzymimi pęcherzami pod naskórkiem, rozległymi nadżerkami na skórze, spęłaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką; wysypka polekowa; rumień wielopostaciowy; ostre uogólnione wysypki; rumień; bardzo rzadko reakcje alergiczne z zapalnymi zmianami skórnymi; wysypka; świąd; pokrzywka;
- krwawienia (w wyniku zmniejszenia liczby płytek krwi),
- napadu padaczki

Ostrzeżenia

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku:

- jeżeli ból gardła jest silny, nie ustępuje po 2 dniach, towarzyszy mu lub dodatkowo pojawia się gorączka, ból głowy, wysypka, nudności lub wymioty;
- jeśli u pacjenta wystąpi zaczerwienienie skóry, pęcherze na ustach, oczach lub jamie ustnej, łuszczenie się skóry;
- gorączki z uogólnionym rumieniem skóry i wysypki krostkowej. Należy wtedy przerwać stosowanie leku;
- jeśli w czasie przyjmowania leku pacjent spożywa alkohol lub przyjmuje środki uspokajające, gdyż lek może wywoływać uczucie senności, a alkohol i leki uspokajające mogą dodatkowo wzmacniać ten efekt;
- jeśli wystąpią objawy dotyczące przewodu pokarmowego, jak: nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu w wyniku stanu zapalnego jelita grubego (niedokrwienne zapalenia jelita grubego). Należy wtedy przerwać stosowanie leku.

Producent

BAYER