

Tabex 1,5 mg, 100 tabletek

Cena: 84,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TABEX
Opakowanie	100 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Palenie, Uzależnienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabex to lek w postaci tabletek, który pomaga osobom rzucić palenie bez doświadczania typowych objawów odstawienia nikotyny. Działając stopniowo, Tabex zmniejsza zależność od nikotyny, co prowadzi do trwałego zaprzestania używania produktów zawierających ten szkodliwy składnik.

Wskazania

Leczenie uzależnienia od nikotyny.

Działanie

Stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania organizmu osoby palącej na nikotynę.

Dawkowanie

Dni terapii:

- od 1 do 3 dnia: 1 tabletkę co 2 godziny, maksymalnie 6 tabletek,
- od 4 do 12 dnia: 1 tabletkę co 2,5 godziny, maksymalnie 5 tabletek,
- od 13 do 16 dnia: 1 tabletkę co 3 godziny, maksymalnie 4 tabletki,
- od 17 do 20 dnia: 1 tabletkę co 5 godzin, maksymalnie 3 tabletki,
- od 21 do 25 dnia: 1-2 tabletki dziennie, maksymalnie 2 tabletki.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: cytyzyna 1,5mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian; skład otoczki (Opadry II): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tabex:

- w przypadku uczulenia na cytyzynę lub na którąkolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej, przebytego zawału serca, klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, niedawno przebytego udaru mózgu,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u osób poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

- zwiększenie apetytu, przyrost masy ciała,
- rozdrażnienie, męczliwość, złe samopoczucie, zmęczenie, zmiany nastroju, lęk, trudności w koncentracji,
- łzawienie oczu,
- przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, zwyżki ciśnienia tętniczego,
- bóle i zawroty głowy,
- zaburzenia snu (bezsennność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary),
- osłabienie popędu płciowego,
- duszność, wzmożone odkrztuszanie,
- bóle mięśniowe,
- wysypka,

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę.
- Lek należy stosować ostrożnie w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnica, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.
- Nie zaleca się stosowania leku u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).
- Lek należy przyjmować wyłącznie przez osoby, które noszą się z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu.
- Jednoczesne przyjmowanie leku i palenie tytoniu może prowadzić do nasilenia się działań niepożądanych.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa