

Tadalafil Maxon 10 mg, 2 tabletki powlekane

Cena: 34,94 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXON
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tadalafil Maxon 10 mg to lek dostępny w postaci podłużnych tabletek powlekanych o jasnopomarańczowej barwie, stworzony specjalnie dla mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji. Zaburzenie to objawia się trudnością w uzyskaniu lub utrzymaniu wystarczająco silnej erekcji prącia, by umożliwić odbycie stosunku płciowego.

Wskazania

Leczenie zaburzeń wzdrodu u dorosłych mężczyzn (impotencji).

Działanie

Wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Zalecana dawka: 1 tabletkę 10 mg, połączyć w całości i popić niewielką ilością wody. Zażyć przynajmniej 30 minut przyjmowana przed aktywnością seksualną. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Skład

Substancją czynną jest Tadalafilum.

Każda tabletkę zawiera 10 mg tadalafilu (Tadalafilum).

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów: z ciężkimi chorobami serca, z niestabilną dławicą piersiową; u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA, z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym; którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeżyli udar.

Działania niepożądane

- Często - ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa i niestrawność.
- Niezbyt często - zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku niewyraźne widzenie, ból oczu, trudności w oddychaniu, obecność krwi w moczu, przedłużony czas trwania wzwodu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonięcie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek i uczucie zmęczenia.
- Rzadko - omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry), krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu i zwiększona potliwość.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tadalafil Maxon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek); szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego); białaczka (nowotwór komórek krwi); jakiegokolwiek zniekształcenie członka; ciężkie choroby wątroby; ciężkie choroby nerek.
- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Maxon i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Leku Tadalafil Maxon nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
- Tadalafil Maxon nie jest przeznaczony dla kobiet.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów