

Tadalafil Mensil 10 mg, 2 tabletki powlekane



Cena: 31,69 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MENSIL
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tadalafil Mensil 10 mg to lek przeznaczony dla dorosłych mężczyzn, który pomaga w leczeniu zaburzeń erekcji. Preparat jest dostępny w postaci jasnoniebieskich tabletek powlekanych przeznaczonych do przyjmowania doustnego, z każdą tabletką zawierającą 10 mg tadalafilu.

Zaburzenia erekcji polegają na trudnościach w uzyskaniu lub utrzymaniu wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku seksualnego. Tadalafil, substancja czynna zawarta w Tadalafil Mensil, należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Jego działanie polega na rozluźnieniu mięśni gładkich i zwiększeniu przepływu krwi do tkanek prącia, co prowadzi do poprawy erekcji. Warto zaznaczyć, że substancja ta nie działa bez stymulacji seksualnej i nie jest skuteczna u osób, u których nie występują zaburzenia erekcji. Zaleca się przyjmowanie tabletki około 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Efekty leku Tadalafil Mensil mogą utrzymywać się nawet przez 36 godzin po jego przyjęciu.

Wskazania

Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Działanie

Pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne członka (po stymulacji seksualnej), wpływając na poprawę erekcji.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: zalecana dawka to 1 tabletkę przyjmowaną przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: tadalafil 10 mg,

- rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian;
- Otoczka Opadry II Blue 85F30605: alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany, tytanudwutlenek (E171), makrogol 3350 i 4000, talk, indygo karmin, lak aluminiowy (E132).

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.
- Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów: z ciężkimi chorobami serca, z niestabilną dławicą piersiową; u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA, z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym; którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeżyli udar.

Działania niepożądane

- Często - ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa i niestrawność.
- Niezbyt często - zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku niewyraźne widzenie, ból oczu, trudności w oddychaniu, obecność krwi w moczu, przedłużony czas trwania wzwodu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek i uczucie zmęczenia.
- Rzadko - omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry), krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu i zwiększona potliwość.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tadalafil Mensil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek); szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego); białaczka (nowotwór komórek krwi); jakiegokolwiek zniekształcenie członka; ciężkie choroby wątroby; ciężkie choroby nerek.
- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Tadalafil Mensil i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Leku Tadalafil Mensil nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
- Tadalafil Mensil nie jest przeznaczony dla kobiet.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław