

Tantum FLU o smaku pomarańczowym, 600 mg+10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek

Cena: 17,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Proszek
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek Tantum Flu w wersji o smaku pomarańczowym łączy kilka substancji aktywnych, które wspomagają walkę z objawami przeziębienia i grypy, przynosząc ulgę w dolegliwościach takich jak gorączka, ból czy zatłokany nos.

Wskazania

Tantum Flu o smaku pomarańczowym należy stosować u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Działanie

- Tantum Flu o smaku pomarańczowym zawiera połączenie substancji czynnych, które są skuteczne w łagodzeniu objawów związanych z przeziębieniem i gripą, w tym dolegliwości bólowych (m.in. bólu gardła i głowy), obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa, oraz w obniżeniu gorączki.
- Paracetamol jest dobrze znanym lekiem przeciwbólowym (analgetykiem). Jest skuteczny w różnych bólach, w tym w bólu głowy, ponadto obniża gorączkę (lek przeciwwgorączkowy).
- Fenylefryny chlorowodorek jest lekiem ułatwiającym oddychanie w wyniku obkurczenia naczyń błony śluzowej nosa. Zmniejsza obrzęk przewodów nosowych, łagodząc ich przekrwienie i zmniejszając ciśnienie w zatokach nosowych, które może powodować ból głowy.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 saszетка co 4-6 godzin. Maksymalnie stosuje się 4 saszetki na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są paracetamol i fenylefryny chlorowodorek.



Każda saszetka zawiera 600 mg paracetamolu i 10 mg fenylefryny chlorowodorku (co odpowiada 8,2 mg fenylefryny).

- Pozostałe składniki to: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, skrobia kukurydziana, sodu cyklamian, sacharyna sodowa, kwas askorbowy, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat czerwonej pomarańczy, kurkumina proszek 5% P-WD (kurkumina E 100 + syrop glukozowy wysuszony)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tantum Flu o smaku pomarańczowym:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca;
- jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) lub nadczynność tarczycy;
- jeśli pacjent przyjmuje lub w ciągu ostatnich 14 dni przyjmował leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), stosowane zazwyczaj w leczeniu depresji;
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i oczu (sympatykomimetyki).

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób: reakcje skórne
- Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych: reakcje alergiczne lub reakcje nadwrażliwości (takie jak wysypka skórna), zmiany we krwi, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować, że łatwiej występuje krwawienie i powstają siniaki), pancytopenia (zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek), agranulocytoza, leukopenia lub neutropenia (zmniejszenie liczby krwinek białych, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakażenia), wysokie ciśnienie krwi, ból głowy, wymioty, kołatanie serca (nieregularne lub przyspieszone bicie serca), ostre zapalenie trzustki (stan zapalny trzustki charakteryzujący się występowaniem nagłego bólu brzucha), trudności w oddawaniu moczu (jedynie u mężczyzn).

Producent

ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Via Amelia 70
00181 Rome