

Tantum Verde, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, 30 ml



Cena: 34,75 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozol
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	odkażające, Przeciwbólowe, Przeciwwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Tantum Verde to lek do stosowania w jamie ustnej i gardle, zalecany w przypadku stanów zapalnych objawiających się bólem, zaczerwienieniem, obrzękiem oraz po zabiegach chirurgicznych w laryngologii i stomatologii.

Wskazania

- Objawowe leczenie stanu zapalnego jamy ustnej i gardła obejmujące objawy jak ból, zaczerwienienie, obrzęk.
- Objawowe leczenie zapalenia błon śluzowych po zabiegach operacyjnych radioterapii i intubacji.

Działanie

Tantum Verde zawiera benzydaminę należącą do grupy leków NLPZ o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Benzydamina miejscowo działa również znieczulająco i odkażająco. Lek osiąga duże stężenie w obrębie tkanek objętych stanem zapalnym. Tantum Verde łagodzi ból i inne objawy związane ze stanem zapalnym wynikającym z zakażenia bakteryjnego, wirusowego, a także po niektórych zabiegach jak radioterapia, intubacja, operacje stomatologiczne i laryngologiczne

Dawkowanie

- Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku (1 rozpylenie) na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.
- Dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.
- Dorośli: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.



Skład

- Substancją czynną jest: benzydamina (Benzydaminii hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tantum Verde:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) oraz częstość nieznana:

- uczucie pieczenia błony śluzowej w jamie ustnej,
- suchość w jamie ustnej,
- nudności, wymioty,
- reakcje nadwrażliwości,
- zaburzenia czucia, drętwienie,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- wysypka.

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może powodować reakcję uczuleniową. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
- Tantum Verde zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AZIENDE CH.ANGELINI