

Tantum Verde 3 mg, smak eukaliptusowy, 20 pastylek twardych



Cena: 27,13 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TANTUM VERDE
Opakowanie	20 pastylek
Postać	Pastylki twarde
Producent	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. SPA
Przeznaczenie	Dezynfekujące (odkażające), Przeciwbólowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Pastylki do ssania **Tantum Verde 3 mg** o smaku eukaliptusowym to lek łagodzący objawy zapalenia jamy ustnej i gardła. Jest przeznaczony do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Wskazania

Lek Tantum Verde stosuje się u osób dorosłych i dzieci od 6. roku życia w:

- leczeniu dolegliwości i objawów związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła: bólu, zaczerwienienia i obrzęku.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyseptyczne. Zmniejszające obrzęk, miejscowo znieczulające.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 6 lat: 1 pastylka, 3 razy na dobę.

Skład

1 pastylka twarda zawiera:

- substancja czynna: 3 mg benzydaminu chlorowodoru,
- pozostałe składniki to: izomalt (E 593), olej eukaliptusowy, kwas cytrynowy jednowodny, acesulfam potasowy, lewomentol, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Przeciwwskazania

- Nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na benzydaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie podawać leku Tantum Verde dzieciom poniżej 6. roku życia.

Działania niepożądane

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- nadwrażliwość na światło.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- pieczenie lub suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

- skurcz krtani,
- obrzęk naczynioruchowy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu,
- niedoczulica jamy ustnej,
- reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości.

Ostrzeżenia

- Nie powinno stosować się tego leku w przypadku stwierdzonego uczulenia na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ.
- Stosować ostrożnie u osób u których w przeszłości występowała astma oskrzelowa ze względu na ryzyko duszności.
- Jeśli po 3 dniach stosowania leku, objawy nie ustępują lub nasiliły się, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek zawiera izomalt - rodzaj cukru, który należy wziąć pod uwagę w przypadku np. występującej nietolerancji fruktozy.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu.

Producent

AZIENDE CH.ANGELINI