

Tantum Verde Forte aerozol do stosowania w jamie ustnej 15ml



Cena: 35,10 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozol
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	odkażające, Przeciwbólowe, Przeciwzapalne, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tantum Verde Forte to lek, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, miejscowo znieczulająco i odkażająco. Jest stosowany w leczeniu objawów takich jak ból, zaczerwienienie i obrzęk gardła związanych ze stanami zapalnymi.

Wskazania

- Leczenie objawowe stanów zapalnych jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapalenia krtani,
- Leczenie objawowe zapalenia błon śluzowych, które jest efektem radioterapii, zabiegów operacyjnych laryngologicznych i stomatologicznych, intubacji.

Działanie

Tantum Verde Forte zawiera w swoim składzie benzydaminę, która należy do grupy leków NLPZ, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje zatem działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dodatkowo benzydamina działa miejscowo odkażająco i znieczulająco.

Dawkowanie

Dorośli: 2-6 razy na dobę po 2-4 dawki.

Skład

- Substancją czynną jest: benzydamina (Benzydaminii hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, olej rycynowy uwodniony, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja smakowo-zapachowa miętowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tantum Verde Forte:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- uszkodzenie skóry w wyniku nadwrażliwości na światło (odczyny fototoksyczne).

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- pieczenie lub suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- skurcz krtani,
- obrzęk naczynioruchowy.

Częstość nieznana:

- reakcja alergiczna,
- nudności, wymioty,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- niedoczulica jamy ustnej.

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem reakcji uczuleniowej.
- Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.
- Lek zawiera olej rycynowy uwodorniony, który może powodować reakcje skórne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

AZIENDE CH.ANGELINI