

Theraflu ExtraGRIP, 650mg+10mg+20mg, proszek w saszetkach do sporządzania roztworów doustnych, 10 sztuk



Cena: 45,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	THERAFLU
Opakowanie	10 saszetek
Postać	Proszek
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Grypa, Katar, Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Theraflu ExtraGRIP to lek przeznaczony do objawowego leczenia grypy i przeziębienia, pomagający złagodzić gorączkę, dreszcze, katar oraz bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Wskazania

Leczenie objawów grypy i przeziębienia:

- gorączka,
- dreszcze,
- bóle mięśni, bóle kostno-stawowe,
- bóle głowy,
- obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa,
- nadmierna wydzielina śluzowa z nosa,
- kichanie.

Działanie

Theraflu ExtraGRIP wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe ze względu na obecność paracetamolu. Feniramina łagodzi objawy jak kichanie, przekrwienie błony śluzowej nosa. Fenylefryna zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa (poprzez swój wpływ na obkurczanie naczyń krwionośnych).

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 saszетка, 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4-6 godzin.

Skład

- Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryna (Phenylephrini hydrochloridum) i feniramina (Pheniramin maleas).
- 1 saszетка zawiera 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodoru fenylefryny i 20 mg maleinianu feniraminy.
- Substancje pomocnicze: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Theraflu ExtraGRIP:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory MAO (lek stosowany w depresji),
- w przypadku schorzeń jak: ciężka choroba serca, bardzo wysokie ciśnienie krwi, nadczynność tarczycy, jaskra z wąskim kątem przesączania, guz chromochłonny nadnerczy,
- jeśli pacjent stosuje: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki beta-adrenolityczne, leki sympatykomimetyczne, leki hamujące apetyt, leki

psychostymulujące,

- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- senność,
- nudności, wymioty.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- bezsenność, nerwowość,
- bóle głowy, zawroty głowy,
- zaparcia, biegunka, dolegliwości brzuszne
- suchość w ustach,
- przyspieszony rytm serca, zwiększone ciśnienie tętnicze, kołatanie serca,
- złe samopoczucie (ogólny dyskomfort, rozbieżność).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zmiany w obrazie krwi: agranulocytoza, leukopenia, pancytopenia.

Ostrzeżenia

- Leku nie stosować łącznie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli występuje: niewydolność nerek i wątroby, niedokrwistość hemolityczna, cukrzyca, choroby układu krwionośnego, padaczka, choroba wrzodowa żołądka.
- Należy skonsultować się z lekarzem jeśli: gorączka utrzymuje się lub zwiększa (3 dni stosowania leku) lub ból/zatkany nos nadal występują (5 dni stosowania leku), występują problemy z oddychaniem.
- Nie należy stosować alkoholu podczas leczenia Theraflu m.in. ze względu na obecność paracetamolu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Producent

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
W. Rzymowskiego 53
Warszawa

Galeria

