

Thiocodin, 20 tabletek



Cena: 22,12 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Thiocodin to lek przeciwkaszlowy stosowany w terapii suchego, męczącego kaszlu bez obecności wydzieliny. Zawiera dwie substancje czynne: kodeinę, która działa hamująco na odruch kaszlowy, oraz sulfogwajakol, wspomagający odkrztuszanie i oczyszczanie dróg oddechowych.

Wskazania

Lek Thiocodin przeznaczony jest do leczenia suchego, uporczywego kaszlu bez odkrztuszania wydzieliny.

Działanie

Tabletki na kaszel Thiocodin zawierają dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu. Kodeina hamuje odruch kaszlowy zmniejszając częstość napadów kaszlu. Sulfagwajakol działa wykrztuśnie, ułatwia przemieszczanie się upłynnionej wydzieliny w drogach oddechowych i jej odkrztuszanie.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie Thiocodinu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 1 tabletką 3 razy dziennie, ale z co najmniej 4–6 godzinną przerwą.

Skład

1 tabletką zawiera:

- 15 mg kodeiny fosforanu półwodnego
- 300 mg sulfogwajakolu
- Pozostałe składniki to: talk, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest nadwrażliwość na kodeinę, sulfagwajakol lub którykolwiek ze składników. Nie stosować Thiocodinu u osób z: astmą oskrzelową, niewydolnością oddechową, śpiączką, mukowiscydozą, rozszerzonymi oskrzelami,

uzależnieniem od alkoholu czy opioidów, bardzo szybkim metabolizmem kodeiny do morfiny, mokrym kaszlem.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): nudności i wymioty, zaparcia, zawroty głowy, uspokojenie.
- Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): reakcje uczuleniowe (świąd, pokrzywka, wysypka, wypryski skórne); nagłe zmiany nastroju (nadmierna radość lub smutek); zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli; kołatanie serca, spadek ciśnienia tętniczego i omdlenia; senność, bóle głowy; zwężenie źrenic, zatrzymanie moczu; zmniejszenie apetytu, zaburzenia widzenia i słuchu; nadmierna potliwość; omamy (sposstrzeganie nieistniejących przedmiotów); ostry ból brzucha (dotyczy to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego), podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, którego objawem mogą być m.in. bóle żołądka (po zażyciu dużych dawek leku).

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku pacjentów z: zmniejszoną objętością krwi, podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym albo urazami głowy, niewydolnością nerek, zaburzeniami czynności wątroby, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, niedoczynnością tarczycy, niedoczynnością kory nadnerczy, jaskrą, chorobami zapalnymi albo prowadzącymi do niedrożności jelit, chorobami dróg żółciowych i po operacji w ich obrębie, rozrostem gruczołu krokowego, utrudnionym oddawaniem moczu, kamicą moczową.
- Kodeina jest przekształcana w morfinę w wątrobie z udziałem enzymu. Morfina jest substancją, która warunkuje działanie kodeiny. U niektórych osób występuje odmiana tego enzymu, co może powodować u nich różne działanie. U niektórych osób morfina nie powstaje lub powstaje w bardzo małych ilościach i wówczas nie będzie miała działania przeciwkaszlowego. U innych osób jest bardziej prawdopodobne wystąpienie ciężkich działań niepożądanych ze względu na bardzo duże ilości powstającej morfiny. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast zasięgnąć porady lekarza: powolny lub płytki oddech, dezorientacja, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcia, brak apetytu.
- Nadużywanie Thiocodinu prowadzi do uzależnienia. W przypadku nadużywania tego leku i nagłym zaprzestaniu jego stosowania mogą wystąpić objawy odstawienne.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Producent

UNIA
Chłodna 56/60
00-872 Warszawa
unia@uniapharm.pl