

Traumon 100 mg/ml, spray, 50 ml

Cena: 32,53 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 ml
Postać	Aerazol
Producent	MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Traumon to spray do stosowania na skórę, wykorzystywany w leczeniu stłuczeń oraz dolegliwości związanych ze zwyrodnieniem stawów kolanowych, barkowych i kręgosłupa. Sprawdza się również w przypadku stanów reumatycznych obejmujących tkanki okołostawowe.

Działanie

Etofenamat - substancja czynna leku Traumon, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Etofenamat należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo wchłania się przez skórę i gromadzi w zmienionych zapalnie tkankach. Stosowanie na skórę ogranicza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych typowych dla NLPZ podawanych doustnie. Traumon nie pozostawia na skórze tłustej warstwy

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy spryskiwać obszar skóry objęty bólem 3 do 5 razy na dobę, pokrywając lekiem powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem. Zazwyczaj wystarczające jest zastosowanie jednorazowo do 7 dawek leku, jednakże w razie konieczności dawkę można zwiększyć. Po każdym 1 do 2 dawkach zaleca się delikatne wtarcie leku w skórę i pozostawienie do wyschnięcia.

Skład

1ml leku zawiera: substancję czynną: etofenamat 100mg, oraz substancje pomocnicze: adypinian diizopropylu, eter makroglu oleinocetylowy (Emulgin M8 Deo), makrogol 400, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na etofenamat, kwas flufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w trzecim trymestrze ciąży,



- u dzieci i młodzieży.

Działania niepożądane

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 100, ale większą niż 1 na 1000 osób): - rumień, pieczenie skóry.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10 000 osób): zapalenie skóry, np. silny świąd, wysypka, obrzęk, wysypka pęcherzowa.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): - reakcja fotouczuleniowa.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa