

Troxescorbin, 50 mg+200 mg, kapsułki twarde, 20 kapsułek

Cena: 15,71 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	PRZEDS. FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE "SYNTEZA" SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antyoksydacyjne, Przeciwozrętkowe, Przeciwwysiękowe, Uszczelniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Troxescorbin to lek zawierający dwie substancje czynne: witaminę C oraz mieszanekę rutozydów (pochodnych flawonowych). Produkt ten wspiera ochronę naczyń krwionośnych, poprawiając ich elastyczność, a także zapobiega retinopatii i nefropatii. Stosuje się go w leczeniu zaburzeń krążenia i żyłaków.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania leku są zaburzenia krążenia limfatycznego i żylnego (w obrębie kończyn dolnych - żyłaki, stany przedżyłakowe, obrzęki, zapalenia skóry towarzyszące żyłakom), żyłaki odbytu oraz nadmierna przepuszczalność naczyń włosowatych (leczenie wspomagające).

Dawkowanie

Dorośli: 1-3 kapsułki na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: O-β-hydroksyetylorutozyd (O-β-hydroxyethylrutosidum) i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).
- Substancje pomocnicze: żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), indygotyna (E132), żółcień pomarańczowa (E110).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego produktu.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób; dla O-beta-hydroksyetylorutozydu): bóle

głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zaczerwienienie twarzy (napadowe), pokrzywka.

- Częstość nieznana (dla witaminy C w dawkach większych niż 600 mg): bóle głowy, nudności, wymioty, zaczerwienienie, zwiększone oddawanie moczu.
- Częstość nieznana (dla witaminy C w dawkach większych niż 1000 mg): kamica nerkowa, biegunka.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność u pacjentów z kamicią dróg żółciowych i moczowych, w dnje moczanowej, talasemii, anemii syderoblastycznej, hemochromatozie, deficycie G-6-PD.
- Lek zawiera barwniki (indygotyna E132, żółcień chinolinowa E104 i pomarańczowa E110), które mogą powodować reakcje alergiczne.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i w miejscu niewidocznym oraz niedostępnym dla dzieci.

Producent

SYNTEZA
Św. Michała 67/71
Poznań