

Tussal Antitussicum, 15 mg, tabletki powlekane, 10 tabletek

Cena: 13,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Tussal Antitussicum to lek przeciwkaszlowy, stosowany w objawowym leczeniu kaszlu suchego (nieproduktywnego) o różnym pochodzeniu.

Wskazania

Objawowe leczenie suchego (nieproduktywnego, nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych) kaszlu.

Działanie

Tussal Antitussicum wykazuje działanie przeciwkaszlowe poprzez hamowanie ośrodka kaszlu w obrębie OUN. Dekstrometorfan tłumi kaszel różnego pochodzenia w wyniku ośrodkowego działania - zmniejsza jego nasilenie i częstotliwość.

Dawkowanie

- Młodzież od 12 roku życia i dorośli: 2 tabletki co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 8 tabletek, czyli 120 mg deksrometorfanu.
- Stosowanie leku w grupie wiekowej 6-12 lat tylko na zalecenie lekarza - 1 tabletka co 6-8 godzin, nie więcej niż 4 tabletki na dobę (60 mg deksrometorfanu).

Skład

- Substancją czynną jest: deksrometorfan (Dextromethorphani hydrobromidum).
- Jedna tabletka powlekana zawiera 15 mg deksrometorfanu bromowodoru (Dextromethorphani hydrobromidum).
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Tussal Antitussicum w przypadku: nadwrażliwości na substancję czynną - bromowodorek deksrometorfanu



lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; astmy oskrzelowej, stanów zapalnych dolnych dróg oddechowych, niewydolności oddechowej lub jeśli istnieje ryzyko jej wystąpienia; ciężkiej niewydolności wątroby; stosowania inhibitorów MAO lub jeśli w ostatnich 14 dniach były one przyjmowane; kaszlu z odkrztuszaniem; karmienia piersią; dzieci poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: wymioty, nudności, zaparcia, bóle brzucha, senność, zawroty głowy, reakcje alergiczne: pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli.

Ostrzeżenia

- U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat tabletki Tussal Antitussicum należy podawać tylko na zlecenie lekarza.
- W przypadku gdy kaszel nie ustępuje lub nasilił się po 4 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
- Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku występowania niewydolności wątroby.
- Nie stosować z innymi lekami zawierającymi w swoim składzie dekstrometorfan.
- Podczas stosowania tego leku nie należy pić alkoholu.
- Lek zawiera laktozę - nie stosować u osób z nietolerancją niektórych cukrów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań