

Tussi Drill, 5 mg/5 ml, syrop, 150 ml



Cena: 22,54 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	PIERRE FABRE MEDICAMENT
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Tussi Drill to lek przeciwkaszlowy stosowany przy ostrym i suchym (nieproduktywnym) kaszlu.

Wskazania

Leczenie doraźne ostrego i suchego kaszlu (nieproduktywnego).

Działanie

Tussi Drill zawiera dekstrometorfan, opioidową pochodną o działaniu przeciwkaszlowym działającą ośrodkowo. Nie wykazuje działania hamującego na czynność ośrodka oddechowego.

Dawkowanie

Dzieci powyżej 6 lat:

- zwykła dawka wynosi 1 mg/kg m.c., podzielona na 4 dawki podawane w odstępach 6 godzinnych. Np. dziecko o wadze 20 kg - 1 łyżeczka miarowa 4 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest: dekstrometorfan (Dextromethorphan hydrobromidum).
- 5 ml syropu (1 miarka) zawiera 5 mg dekstrometofanu bromowodoru.
- Substancje pomocnicze: maltitol ciekły, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodu, zapach karmelowy 28A103, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tussi Drill:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- w przypadku niewydolności oddechowej lub ryzyku jej wystąpienia,
- jeśli pacjent ma kaszel astmatyczny (nieuzasadnione jest stosowanie leków przeciwkaszlowych z rozszerzającymi oskrzela),
- jeśli pacjent stosuje inhibitory MAO (leki stosowane w depresji),
- u dzieci poniżej 6 lat,
- w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- zawroty głowy, senność,
- zaparcia, nudności, wymioty,
- reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera maltitol - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów.
- Lek zawiera parahydroksybenzoetan sodowy (metylu i propylu) - ryzyko reakcji alergicznych, również typu późnego.
- Należy wziąć pod uwagę, że lek może obniżyć sprawność psychomotoryczną u dzieci.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego 5 dni.

Producent

PIERRE FABRE SANTE
Francja