

ULGIX LAXI (DOCULAX) 50MG * 30 KAPSUŁEK

Cena: 17,30 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Ulgix Laxi to lek, który pomaga ułatwić proces wypróżniania, ale jednocześnie nie pobudza perystaltyki jelit. Działa łagodnie, pomagając w regulowaniu procesu defekacji, co może być przydatne w przypadku zaparc lub trudności w wypróżnianiu. Jego działanie jest ukierunkowane na ułatwienie wypróżniania, bez wywoływania nadmiernego pobudzenia jelit.

Wskazania

Zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparc, wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy oddawaniu stolca, przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Działanie

Zawarty w leku dokuzynian sodu jest związkiem powierzchniowo czynnym. Działa emulgująco i zmniejsza napięcie powierzchniowe na granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych. Dzięki temu ułatwia przenikanie wody i tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym, co zmienia konsystencję stolca i ułatwia wypróżnienie. Dokuzynian nie pobudza perystaltyki jelit.

Dawkowanie

- Dorośli: od 1 do 4 kapsułek na dobę (od 50 mg do 200 mg)
- Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 2 kapsułek na dobę (od 50 mg do 100 mg)

Skład

1 kapsułka zawiera: sodu dokuzynian (Natrii docusas) 50mg oraz substancje pomocnicze: makrogol 400, glicerol, glikol propylenowy, żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ulgix Laxi:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku w przypadku nudności i wymiotów
- w przypadku wystąpienia zapalenia wyrostka robaczkowego
- w przypadku wystąpienia niedrożności jelit oraz stanów zagrażających wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy)
- w razie ostrego bólu o nieznanym przyczynie w jamie brzusznej
- w przypadku krwawienia z powodu pokarmowego o nieznanym przyczynie
- w przypadku stanów odwodnienia organizmu

Działania niepożądane

- nudności, wymioty, uczucie gorzkiego smaku, bóle w nadbrzuszu, kolkowe bóle jelit, biegunkę

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sorbitol. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.