

Ulgix Wzdęcia 80 mg, 100 kapsułek miękkich

Cena: 26,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ULGIX
Opakowanie	100 kapsułek
Postać	Kapsułki miękkie
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Eliminacja gazów, Normalizujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Ulgix Wzdęcia 80 mg to wyrób medyczny dostępny w postaci żelatynowych kapsułek, który pomaga łagodzić dolegliwości związane z nagromadzeniem gazów w jelitach, takie jak uczucie pełności, wzdęcia oraz odbijanie. Może być także stosowany pomocniczo przed przeprowadzeniem badań diagnostycznych jamy brzusznej za pomocą technik obrazowych. Poprzez eliminację gazów i powietrza z przewodu pokarmowego, przyczynia się do poprawy jakości uzyskiwanych obrazów i redukuje trudności diagnostyczne.

Składniki

1 kapsułka zawiera:

- 80 mg symetykonu,
- substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa.

Zastosowanie

- Objawy związane z nagromadzeniem gazów w jelitach, takie jak: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.
- W celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową.

Sposób użycia

Objawy związane z nagromadzeniem gazów w jelitach

- Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka 3-4 razy w ciągu doby.

Przygotowanie do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej



- W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka 3 razy dziennie.
- W dniu badania: 2 kapsułki rano na czczo.

Przeciwwskazania

Wyrobu Ulgix Wzdęcia nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na symetykon lub inny składnik wyrobu.

Ostrzeżenia

- Nie przekraczać zalecanej dawki.
- Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej.
- Jeśli dotychczasowe objawy utrzymują się lub nasilają i występują nowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zaleca się konsultację lekarską w celu ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

Ważne wskazówki

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Producent

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242E
51-131 Wrocław