

Ultrapiiryna Fast C 500 mg + 250 mg, 10 tabletek musujących

Cena: 24,03 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ULTRAPIIRYNA
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki musujące
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Ultrapiiryna Fast, zawierająca kwas acetylosalicylowy, działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Lek dostępny jest w formie tabletek rozpuszczalnych o smaku cytrynowym, przeznaczonych dla młodzieży od 12 roku życia oraz dorosłych.

Wskazania

Lek Ultrapiiryna Fast C stosuje się u dorosłych oraz u młodzieży powyżej 12 roku życia (wyłącznie na zalecenie lekarza):

- w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych o małym i/lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle mięśni, bóle głowy, bóle zębów),
- w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek musujących. W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.
- Młodzież powyżej 12 lat: wyłącznie na zalecenie lekarza jednorazowo 1 tabletkę. Jeśli to konieczne dawka jednorazowa może być powtarzana nie częściej niż co 4 do 8 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 3 tabletki na dobę.

Skład

1 tabletkę musującą zawiera:

- substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 500 mg, kwas askorbowy 250 mg,

- substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, sodu węglan, sodu diwodorocytrynian, sodu cytrynian, powidon K 30, mannitol (E 421), sodu dokuzynian, symetykon, sodu cyklaminia, sacharyna sodowa, aromat cytrynowy "KS", kod 145 (naturalne preparaty aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne, substancje aromatyczne, mannitol (E 421), glukonolakton (E 575), sorbitol (E 420), maltodekstryna, akacja (E 414), krzemionka koloidalna bezwodna (E 551)).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Skaza krwotoczna.
- Ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
- Ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby, lub ciężka niewydolność nerek.
- Napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- Jednoczesne stosowanie leku metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
- III trymestr ciąży.
- Wiek poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Po zastosowaniu produktu mogą wystąpić następujące działania niepożądane: Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja, zaburzenia czynności wątroby, zawroty głowy i szumy uszne, zwiększone ryzyko krwawień, zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek, reakcje nadwrażliwości, astma oskrzelowa.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania Ultrapiryna Fast C należy omówić to z lekarzem: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe; jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby; jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub zaburzenia krążenia, (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia), gdyż kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent ma chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozy-6- fosforanowej; jeśli pacjentka karmi piersią.
- Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. Należy zachować ostrożność u pacjentów z kamicą szczawianowo-wapniową.
- Lek Ultrapiryna Fast C zawiera sód i sorbitol oraz glukozę.

Producent

USP