

UniGel Procto Wyrób medyczny 5 sztuk

Cena: 26,22 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	UNIGEL
Opakowanie	5 czopków
Postać	Czopki
Producent	APOTEX NEDERLAND B.V.
Przeznaczenie	Ból, Hemoroidy, Krwawienie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UniGel Procto to produkt medyczny w postaci czopków doodbytniczych, które są przeznaczone do wsparcia procesu gojenia zarówno ostrych, jak i przewlekłych ran błony śluzowej odbytu i odbytnicy. Te hipoalergiczne czopki zostały opracowane z myślą o pacjentach cierpiących na hemoroidy, pęknięcia, rany i uszkodzenia w okolicy odbytu.

Działanie czopków UniGel Procto opiera się na ich właściwościach kojących, które przyczyniają się do redukcji objawów takich jak krwawienie, pieczenie i swędzenie – typowe symptomy towarzyszące hemoroidom. Produkt medyczny dodatkowo wspomaga proces ziarninowania i regeneracji nabłonka, co przeciwdziała stanom zapalnym w okolicach rany. Czopki doodbytnicze są bezpieczne dla osób w każdym wieku, w tym także dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ich wydłużony kształt ułatwia aplikację, a składający się z sproszkowanego kopolimeru HEMA-HAS oraz bazy tłuszczowej Witepsol 25 W skład nie jest wchłaniany przez organizm.

Składniki

UniGel Procto to biały czopek o kształcie torpedy, zawierający sproszkowany kopolimer HEMA-HAS oraz bazę tłuszczową (Adeps solidus).

Sposób użycia

- W miejscu perforacji blistra należy oddzielić jeden czopek od całego opakowania, lekkim szarpnięciem otworzyć opakowanie jednostkowe i wyjąć czopek.
- Czopki wprowadza się do odbytnicy, o ile to możliwe po wypróżnieniu i podmyciu się.
- Czopek należy włożyć głęboko do odbytnicy, zaostrozonym końcem skierowanym w stronę odbytu, najlepiej w lekkim skłonie w przód.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
- Niewystarczająca długość odbytnicy (u dzieci do 3 miesiąca lub wcześniaków).



Uwagi

- Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 15-25°C.
- Wyrób jednorazowy. Nie stosować ponownie.
- Produkt doodbytniczy. Nie wprowadzać do innych części ciała.