

Unituss Junior 60 mg/ 10 ml, syrop, 120 ml



Cena: 21,50 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Unituss Junior to syrop o truskawkowym zapachu, przeznaczony dla dzieci powyżej 2. roku życia oraz dorosłych. Jego substancją czynną jest lewodropropizyna (Levodropropizinum), która działa przeciwkaszlowo i łagodzi skurcz oskrzeli. Syrop jest stosowany do objawowego leczenia suchego kaszlu o różnym pochodzeniu, takim jak kaszel spowodowany rakiem płuc, zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych oraz krztuścem. Może być używany wyłącznie w okresie oczekiwania na rozpoznanie przyczyny kaszlu lub na efekt leczenia choroby wywołującej kaszel.

Wskazania

Lek Unituss Junior stosuje się u osób powyżej 2. roku życia w:

- objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu różnego pochodzenia.

Działanie

Hamowanie kaszlu.

Dawkowanie

- Dzieci powyżej 2. roku życia o wadze 10-20 kg: 3 ml syropu, 3 razy na dobę.
- Dzieci powyżej 2. roku życia o wadze 20-30 kg: 5 ml syropu, 3 razy na dobę.
- Dzieci o wadze powyżej 30 kg, młodzież i dorośli: 10 ml syropu, 3 razy na dobę.

Skład

10 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: lewodropropizyna 60 mg,
- substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), sacharoza, aromat

truskawkowy 502301T: glikol propylenowy (E 1520) i substancje zapachowe, kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną bądź którykolwiek z pozostałych składników syropu Unituss Junior.
- Obfita wydzielona oskrzelowa i zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).
- Ciąża, karmienie piersią.
- Nie podawać leku dzieciom poniżej 2. roku życia.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- pokrzywka, rumień, osutka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk występujący zwykle w obrębie twarzy lub gardła, mogący zagrażać życiu), reakcje skórne,
- bóle żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka,
- reakcje alergiczne, w tym natychmiastowe, ogólne złe samopoczucie,
- zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drżenia, mrowienie, drętwienie,
- kołatania serca, częstoskurcz, obniżenie ciśnienia tętniczego,
- drażliwość, senność, depersonalizacja (zaburzenie postrzegania własnej osoby i otoczenia),
- duszność, kaszel, obrzęk błony śluzowej układu oddechowego,
- niedobór lub brak sił (astenia) i osłabienie kończyn dolnych.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zapalenie języka i altowe zapalenie jamy ustnej z gorączką,
- stan zapalny spowodowany zatrzymaniem odpływu żółci z wątroby (cholestatyczne zapalenie wątroby),
- przypadki uogólnionego obrzęku, omdleń i osłabienia,
- napady padaczki – duży napad padaczkowy (drgawki kloniczno-toniczne) oraz mały napad padaczkowy (bezdrgawkowy, tzw. napad typu petit mal),
- rozszerzenie źrenic oraz utrata zdolności widzenia (w obu przypadkach objawy ustąpiły po odstawieniu leku),
- przypadki obrzęku powiek, które w większości można uznać za obrzęk naczynioruchowy, biorąc pod uwagę jednoczesne wystąpienie pokrzywki,
- senność, obniżenie napięcia mięśni oraz wymioty u noworodka, co przypisano przedostaniu się do organizmu dziecka lewodropropizyny przyjmowanej przez karmiącą piersią matkę (objawy pojawiły się po karmieniu i ustąpiły spontanicznie po ominięciu kilku karmień piersią).

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku Unituss Junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Unituss Junior stosuje się w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu i można go używać tylko w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu i/lub na efekt odrębnego leczenia choroby, która ten kaszel powoduje.
- Lek Unituss Junior zawiera sacharozę, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan i glikol propylenowy.
- W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce.
- W przypadku pominięcia dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu jej uzupełnienia. Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwyczajnej porze.
- Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <35 mL/min).

Producent

UNIA
Chłodna 56/60
Warszawa