

UroFuraginum Max 100mg, 15 tabletek

Cena: 14,05 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | UROFURAGINUM |
| Opakowanie | 15 tabletek |
| Postać | Tabletka |
| Producent | ADAMED PHARMA S.A. |
| Przeznaczenie | Zapalenie pęcherza moczowego |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych |

Opis produktu

Opis

UroFuraginum Max to lek dostępny w postaci tabletek do stosowania doustnego. Jego głównym składnikiem aktywnym jest furazydyna, znana również jako furagina, substancja będąca pochodną nitrofuranu. Działa ona poprzez zahamowanie rozwoju wielu rodzajów bakterii, które mogą powodować zakażenia dróg moczowych

Wskazania

Zakażenia dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia: Pierwszy dzień stosowania: 400 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych (1 tabletka co 6 godzin); następne dni leczenia: 300 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (1 tabletka co 8 godzin).

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: furazydynę, zwaną także furaginą,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna krzemowana o składzie: celuloza mikrokrystaliczna 98%, krzemionkakoloidalna bezwodna 2%, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typu A.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku uroFuraginum Max:

- jeśli pacjent ma uczulenie na furazydynę lub pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w pierwszym trymestrze ciąży,
- w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości

- hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych),
- jeśli u pacjenta występuje polineuropatia obwodowa np. cukrzycowa,
 - jeśli pacjent ma niedobór enzymu dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu

biorącego udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach),

- jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz), a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy.

Działania niepożądane

- Nudności,
- Bóle głowy,
- Nadmierne oddawanie gazów.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów.