

Vagisan Cremolum, nawilżające globulki dopochwowe, 16 sztuk

Cena: 49,19 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	16 sztuk
Postać	Globulki dopochwowe
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Regenerujące (odbudowujące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Vagisan Cremolum to globulki dopochwowe, które po wprowadzeniu do pochwy rozpuszczają się, tworząc gładki i kojący krem. Produkt łagodzi objawy takie jak suchość, pieczenie, swędzenie, drobne rany i ból, które mogą być wynikiem różnych przyczyn. Globulki zawierają bufor składający się z kwasu mlekowego i mleczanu wapnia, co nadaje kremowi pH na poziomie 4,5, pomagając w utrzymaniu zdrowego środowiska pochwy. Vagisan Cremolum jest wolny od hormonów, co pozwala na stosowanie go razem z hormonalną terapią zastępczą lub naprzemiennie z kremami czy globulkami dopochwowymi zawierającymi estrogeny.

Składniki

mleczan wapnia, alkohol cetearylowy, uwodornione glicerydy kokosowe, kwas mlekowy, stearynian glicerolu PEG-20, karbomer sodowy.

Zastosowanie

Dolegliwości spowodowane suchością pochwy, takie jak: suchość, pieczenie, świąd, niewielkie otarcia oraz ból podczas stosunku płciowego.

Sposób użycia

Globulki należy wprowadzać do pochwy jak najgłębiej- najlepiej przed pójściem do łóżka. Najlepiej to zrobić leżąc na plecach z lekko zgiętymi nogami. Zalecane jest noszenie wkładki higienicznej. Aby wyjąć globulkę z opakowania, należy najpierw oddzielić ją wzdłuż perforacji od pozostałych globulek w pasku. Globulkę należy wyjąć z blistra, rozrywając folię w dół, korzystając przy tym z ułatwiającego otwieranie wycięcia w folii w kształcie litery V. Następnie można wypchnąć globulkę z folii blistra. Na początku zaleca się codzienne stosowanie. Gdy objawy ulegną złagodzeniu, częstotliwość stosowania można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. zredukować lub 2 do 3 razy w tygodniu.

Przeciwwskazania

Globulek nie wolno stosować w przypadku znanej nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. Globulek nie należy



stosować bezpośrednio po porodzie. Globulek nie należy stosować w przypadku infekcji pochwy, w takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki

- Globulka nie zawiera żadnych hormonów ani substancji zapachowych i konserwujących.
- W przypadku poważniejszych objawów suchości należy najpierw skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku uszkodzenia paska foliowego lub zmiany wyglądu globulki nie używać produktu i należy poinformować producenta.
- Ponieważ globulki potrzebują około 20-30 minut na rozpuszczenie się i utworzenie kremu w pochwie, globulek nie powinno się stosować bezpośrednio przed stosunkiem płciowym.
- Globulki nie zawierają spermicydów i dlatego nie chronią przed niechcianą ciążą.
- Globulek nie powinno stosować się z prezerwatywami lub krążkami dopochwowymi.
- Nie zaleca się stosowania globulek dopochwowych przed stosunkiem przez kobiety pragnące zajść w ciążę.
- Produkt przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni C.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Jeśli globulki są dobrze tolerowane, to mogą być bezpiecznie używane przez dłuższe okresy czasu, również w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.
- Sporadycznie może pojawić się łagodne miejscowe, tymczasowe podrażnienie (np. swędzenie, pieczenie), jak i nieznaczna ilość wydzieliny.
- W rzadkich przypadkach możliwe są bardziej wyraźne podrażnienia skóry i reakcje nadwrażliwości (np. zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie), które mogą utrzymać się przez dłuższy czas. Jeśli objawy te nie łagodnieją, należy przerwać stosowanie globulek i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku zaobserwowania innych nieprzyjemnych reakcji należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56,
33611 Bielefeld,
Niemcy.