

Valinger 25 mg, 4 tabletki

Cena: 20,03 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Opakowanie	4 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	ORION CORPORATION
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Valinger to lek zawierający sildenafil jako substancję czynną, który wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w penisie. Działanie to prowadzi do zwiększenia napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego, co ułatwia osiągnięcie i utrzymanie wzwodu. Lek jest wskazany w przypadku problemów z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu, które uniemożliwiają odbycie stosunku.

Wskazania

Leczenie zaburzeń wzwodu, określanych jako impotencja, objawiająca się problemami z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu prącia, co uniemożliwia odbycie stosunku płciowego.

Działanie

Zwiększenie napływu krwi do penisa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: 1 tabletka (25mg) dziennie, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną sildenafil 25mg w postaci sildenafilu cytrynianu.
- substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa; otoczka: hypromeloza (2910; 6 mPa s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników produktu.
- Przyjmowanie azotanów.

- Stosowanie leków uwalniających tlenek azotu, w tym azotan amylu.
- Przyjmowanie riocyguatu.
- Poważne problemy z sercem lub wątrobą.
- Niedawny udar, zawał serca lub niskie ciśnienie tętnicze krwi.
- Niektóre rzadkie dziedziczne choroby oczu, w tym zwyrodnienie barwnikowe siatkówki.
- Wystąpienie w przeszłości utraty wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION).

Działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

- ból głowy.

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):

- nudności,
- nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca,
- niestrawność,
- zaburzenia widzenia,
- uczucie zatkanego nosa,
- zawroty głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób):

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oczu, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, nadwrażliwość na światło, łzawienie oczu,
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi,
- bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku,
- zawroty głowy, dzwonienie w uszach,
- suchość w jamie ustnej,
- zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa,
- ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę),
- krew w moczu,
- ból rąk lub nóg,
- krwawienie z nosa,
- uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 osób):

- omdlenie, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
- uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
- krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, choroba siatkówki wywołana miazdżycą, zaburzenia tęczówki, podwójne widzenie, zmniejszona

ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra), krótkowzroczność, zmęczenie oczu, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie poświaty wokół źródeł światła (efekt halo), rozszerzenie źrenicy, przebarwienie białka oka,

- krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu,
- suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,
- uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

- W przypadku nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

- Leku Valinger nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi terapiami zaburzeń wzrodu.
- Stosowanie leku nie jest wskazane u osób, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
- Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.
- Leku Valinger nie należy stosować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) zawierającymi sildenafil ani innymi inhibitorami PDE5.
- Pacjenci z zaburzeniami nerek lub wątroby nie powinni stosować dawki leku większej niż 25mg i przed rozpoczęciem przyjmowania leku powinny skonsultować się z lekarzem.
- Leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Producent

ORION CORPORATION