

Valinger Forte, 50 mg, tabletki powlekane, 2 tabletki

Cena: 20,03 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Opakowanie	2 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	ORION CORPORATION, ESPOO
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis
Valinger Forte to lek zawierający syldenafil, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Wskazania
Lek Valinger Forte jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Działanie
Valinger Forte wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu i zwiększa napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Valinger Forte należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połączyć w całości, popijając szklanką wody.

Skład

- Substancją czynną jest syldenafil w postaci cytrynianu.
- Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: Wapnia wodorofosforan dwuwodny, Celuloza mikrokrystaliczna, Magnezu stearynian, Koloidalna krzemionka bezwodna, Kroskarmeloza sodowa. Otoczka: Hypromeloza (2910; 6 mPa s), Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, Talk, Indygotyna, lak (E 132).

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.
- Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i wątroby, niskim ciśnieniem, po niedawnym przebytych udarze lub zawale, z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) oraz jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

- Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): ból głowy.
- Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują nagłe uczucie ciepła w górnej części ciała), niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
- Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oczu, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, nadwrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
- Rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 osób): omdlenie, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, choroba siatkówki wywołana miażdżycą, zaburzenia tęczówki, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra), krótkowzroczność, zmęczenie oczu, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie poświaty wokół źródeł światła (efekt halo), rozszerzenie źrenicy, przebarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

- Ważne jest, aby w ciągu pierwszych 6 miesięcy stosowania leku Valinger Forte po konsultacji z lekarzem wykluczyć inne poważne choroby, które mogą być przyczyną zaburzeń erekcji, takie jak: choroby serca i naczyń krwionośnych, cukrzyca, nadciśnienie, podwyższone stężenie cholesterolu.
- Należy skonsultować zastosowanie leku z lekarzem w przypadku występowania kiedykolwiek ponad 4-godzinnej erekcji, nawet bez podniecenia seksualnego, anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroby wrzodowej; zaburzeń krzepnięcia, choroby nowotworowej kości, choroby nowotworowej krwi.
- Nie należy przyjmować leku, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
- Valinger Forte nie jest przeznaczony dla kobiet.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

ORION CORPORATION/ORION OYJ
Orionintie 1
FL-02200 Espoo, Finlandia