

Vemonis Femi, tabletki powlekane, 12 tabletek

Cena: 24,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VEMONIS FEMI
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Rozkurczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Vemonis Femi to lek, który działa przeciwbólowo i rozkurczająco, co czyni go skutecznym w łagodzeniu bólu związanego ze skurczami, takimi jak kolka jelitowa czy bolesne miesiączkowanie.

Wskazania

Wskazania do stosowania: ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu; bóle związane ze stanami skurczowymi mięśni gładkich: układu moczowo - płciowego (kolka nerkowa, bolesne miesiączkowanie), przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie przewodów żółciowych), gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane.

Działanie

Działanie leku Vemonis Femi wynika z połączenia 3 substancji czynnych. Metamizol działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz rozkurczowo. Kofeina wzmacnia działanie przeciwbólowe metamizolu. Wykazuje również działanie relaksujące na mięśnie gładkie oraz moczopędne. Drotaweryna rozkurcza mięśnie gładkie narządów wewnętrznych.

Dawkowanie

Dorośli: 1 lub 2 tabletki dwa lub trzy razy dziennie. Nie częściej niż co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobową to 6 tabletek.

Skład

- Substancjami czynnymi są metamizol sodu (Metamizolum natrium), kofeina (Coffeinum) oraz drotaweryny chlorowodorek (Drotaverini hydrochloridum).
- 1 tabletka zawiera 400 mg metamizolu, 60 mg kofeiny oraz 40 mg drotaweryny.
- Substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Krospowidon typ A Talk Magnezu stearynian. Otoczka (OPADRY AMB biała) Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171) Talk Lecytyna sojowa Guma ksantan

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować leku Vemonis Femi, jeśli pacjent: ma uczulenie na metamizol, kofeinę, drotawerynę, pochodne pirazonu (np. fenazon, propyfenazon) lub pirazolidyn (np. fenylobutazon, oksyfenbutazon) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ma niski poziom białych krwinek (granulocytopenię); ma zaburzone funkcjonowanie szpiku kostnego (np. po leczeniu cytostatykiem) lub zaburzenia układu krwiotwórczego; ma astmę lub nietolerancję związaną z przyjmowaniem niektórych leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacyna czy naproksen, objawiające się np. skurczem oskrzeli, pokrzywką, katarem, obrzękiem naczynioruchowym; ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby; ma ciężką niewydolność serca; ma blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia; ma pewne schorzenia metaboliczne (porfiria, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej); ma niedokrwistość.

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) występują: wysypka polekowa (przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa);
- Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) występują: - zmiany skórne grudkowo-plamkowe; - leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi); - bezsenność (związana z drotaweryną); drżenie; kołatanie serca.
- Działania niepożądane o częstości nieznanej (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wrzody trawienne i krwawienie, wymioty, zgaga, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, zatwardzenie, podrażnienie żołądka, biegunka, suchość w ustach; zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białkówki oczu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi; bóle i zawroty głowy; czerwone zabarwienie moczu (po zastosowaniu bardzo wysokich dawek metamizolu); zmiany w poziomie glukozy krwi (wysoki i niski poziom glukozy); drażliwość, bezsenność (związana z kofeiną), nerwowość, niepokój; nadaktywność psychoruchowa; zwiększenie siły kurczliwości mięśnia sercowego, nieregularny rytm serca (arytmia), przyspieszone bicie serca (tachykardia); zaczerwienienie twarzy, szyi i dekoltu; wysypki/wykwity skórne różnego rodzaju, zmiany wysiękowe, nadmierna potliwość; skurcze mięśni; wyczerpanie; obniżone ciśnienie krwi; - zespół odstawienia leku (najczęstszym objawem odstawienia kofeiny jest ból głowy), zdenerwowanie; przyspieszona praca serca, zwiększony przepływ moczu, podwyższony klirens kreatyniny, zwiększone wydalanie sodu i wapnia.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem Vemonis Femi należy się skontaktować z lekarzem jeśli: pacjent ma wysoką gorączkę; pacjent ma problemy z nerkami lub wątrobą; pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, w złym ogólnym stanie zdrowia lub z niewydolnością nerek.
- Lek może zmniejszać ilość komórek krwi.
- Lek może powodować obniżenie ciśnienia krwi.
- Ze względu na zawartość kofeiny leku nie powinno stosować się tuż przed snem oraz unikać nadmiernego spożycia kofeiny z innych źródeł.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
adamed@adamed.com

Galeria

