

Venescin forte, 30 tabletek



Cena: 21,83 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VENESCIN
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Przeznaczenie	Skurcze, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Venescin Forte to lek, który został opracowany dla osób dorosłych i ma zastosowanie w leczeniu przewlekłej niewydolności żylną o różnym pochodzeniu. Choroba ta manifestuje się poprzez objawy takie jak obrzęki, kurcze łydek, swędzenie, ból, uczucie ciężkości w nogach. Lek może być także stosowany pod kontrolą lekarza w przypadku żylakowatości (żylaków).

Skład preparatu Venescin Forte obejmuje:

- Wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego, który charakteryzuje się właściwościami przeciwobrzękowymi oraz zdolnością do zwiększania napięcia naczyń krwionośnych.
- Rutozyd, znany również jako rutyna, działający na naczynia krwionośne poprzez zmniejszanie ich przepuszczalności oraz wzmacnianie ich odporności mechanicznej.

Wskazania

Przewlekła niewydolność żylna różnego pochodzenia objawiająca się obrzękami, kurczami łydek, świądem, bólem i uczuciem ciężkości w nogach.

Działanie

Przeciwobrzękowe.

Dawkowanie

Dorośli: 3 razy dziennie od 1 do 2 tabletek drażowanych.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancje czynne: wyciąg suchy z nasion kasztanowca (*Hippocastani seminis extractum siccum*) (5,5-8:1), o zawartości średnio 22% saponin trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę 100 mg, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V), rutozyd trójwodny (*Rutosidum trihydricum*) 60 mg,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól sodowa glikolanu skrobi typ A, stearynian magnezu, sacharoza, talk, guma arabska, kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa (E104), indygotyna (E132).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Venescin Forte

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
- u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

- zaburzenia żołądka i jelit
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej.

Ostrzeżenia

- Zastosowanie w żyłakach wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.