

Venoruton Gel 40 g

Cena: 24,99 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VENORUTON
Opakowanie	40 g (tuba)
Postać	Żel
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Opuchlizna (obrzęk), Skręcenia, Uczucie ciężkich nóg, Żylaki
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Venoruton Gel 20 mg/g to lek w postaci żelu, należący do grupy środków ochrony naczyń żylnych, znanych jako systemowe protektory żył. W składzie Venoruton Gel znajduje się aktywna substancja 0-(beta-hydroksyetylo)-rutozydy, która pomaga w stabilizacji ściany naczyń żylnych, ograniczając ich przepuszczalność oraz łamliwość. Dzięki temu działaniu zmniejsza się obrzęk. Lek ten ma zdolność redukowania dolegliwości związanych z obrzękiem, takich jak ból, uczucie zmęczenia, mrowienie, ociążałość nóg i skurcze. Venoruton Gel może być również stosowany w przypadku objawów urazowych, takich jak skręcenia, zwichnięcia czy stłuczenia mięśni. Produkt nie zawiera alkoholu, jest przyjemny w stosowaniu na skórę, nie ma zapachu i nie pozostawia tłustego uczucia. Jego zastosowanie zapewni uczucie świeżości, a jego łagodna formuła umożliwi wielokrotne stosowanie miejscowe.

Wskazania

Lek Venoruton Gel 20 mg/ g stosuje się u osób dorosłych do miejscowego stosowania na skórę:

- w bólach i obrzękach nóg wywołanych przewlekłą niewydolnością żylną i objawami z tym związanymi takimi jak: uczucie ciężkości i bóle kończyn dolnych, obrzęki kończyn dolnych,
- w stanach bólowych po leczeniu obliteracyjnym żyłaków (tj. polegającym na wstrzykiwaniu do naczyń żylnych preparatów powodujących ich zamykanie),
- w bólach i obrzękach w następstwie skręceń i kontuzji mięśni.

Działanie

Zmniejszające obrzęk i przynoszące ulgę w związanych z nim objawach takich jak: ból, zmęczenie, mrowienie, ociążałość nóg oraz skurcze.

Dawkowanie

Dorośli: stosować Venoruton Gel rano i wieczorem na chorą powierzchnię. Wcierać delikatnie aż do pełnej penetracji leku, tzn. aż skóra będzie sucha. Jeśli to konieczne, Venoruton Gel może być stosowany pod bandaż elastyczny lub opatrunek okluzyjny.



Skład

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: 20 mg 0-(beta-hydroksyetylo)-rutyzydów,
- substancje pomocnicze: karbomer, sodu wodorotlenek, disodu edetynian dwuwodny, chlorek benzalkoniowy 0,05 mg/g, woda oczyszczona

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.
- I trymestr ciąży.

Działania niepożądane

- uczulenie z wystąpieniem reakcji skórnych,

Ostrzeżenia

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią bądź przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje zajść w ciążę, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.