

Veral, 10 mg/g (1%), żel, 55 g



Cena: 11,60 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	55 g
Postać	Żel
Producent	HERBACOS RECORDATI S.R.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwozrękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Veral jest lekiem w formie żelu przeznaczonym do stosowania miejscowego, który pomaga redukować ból, stany zapalne oraz obrzęki, szczególnie te powstałe w wyniku urazów. Charakteryzuje się również efektem chłodzącym.

Wskazania

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń)

bólu pleców

- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat):

- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

Działanie

Substancja czynna zawarta w leku Veral ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwozrękowe.

Dawkowanie

- U dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku urazów mięśni i stawów (skręcenia, nadwyrężenia lub stłuczenia) i zapalenia ścięgien.
- U dorosłych (powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak (Diclofenacum natricum)
- 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku
- Substancje pomocnicze: alkohol etylowy 96%, alkohol izopropylowy, roztwór 10% wodorotlenku amonowego, karbomer, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Veral:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni.
- w trzecim trymestrze ciąży.
- u osób poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

- Rzadko (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z pęcherzykami, łuszczeniem się skóry, uczuciem pieczenia.
- Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma); obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani; pokrzywka.
- W przypadku wystąpienia innych wymienionych działań niepożądanych należy, poinformować lekarza lub farmaceutę.
- Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.
- Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować leku na uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski. Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka skórna.
- Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry oraz przez długi okres czasu, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza.
- Lek jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w jamie ustnej. Po użyciu należy umyć ręce.
- Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Jednoczesne bandażowanie może być stosowane, ale nie mogą to być nieprzepuszczające powietrza bandaż.
- Leku nie wolno stosować w trzecim trymestrze ciąży.
- Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Producent

Saneca Pharmaceuticals a.s.,
Nitrianska 100
Hlohovec, Republika Słowacji