

Viagra Connect Max 50 mg, 2 tabletki

Cena: 63,19 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	VIAGRA
Opakowanie	2 tabletki
Postać	tabletki powlekane
Producent	UPJOHN EESV
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Viagra Connect Max to tabletki powlekane przeznaczone dla dorosłych mężczyzn z problemami z erekcją. Zaburzenia erekcji objawiają się brakiem możliwości uzyskania lub utrzymania erekcji prącia, co uniemożliwia aktywność seksualną. Substancją czynną w leku jest syldenafil, który należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Syldenafil działa przez rozkurczanie naczyń krwionośnych w prąciu, co zwiększa napływ krwi i prowadzi do erekcji w odpowiedzi na pobudzenie seksualne. Lek Viagra Connect Max pomaga osiągnąć i utrzymać wzwód, gdy występuje pobudzenie seksualne. Produkt jest przeznaczony dla mężczyzn powyżej 18. roku życia.

Wskazania

Viagra Connect Max 50 mg stosuje się u dorosłych mężczyzn w leczeniu: zaburzeń erekcji, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Działanie

Lek Viagra Connect Max 50 mg to tabletki na erekcję, które działają poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka zależnie od potrzeb, około godziny przed aktywnością seksualną.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu),
- pozostałe składniki: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa i

magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna iindygotyna (E132).

Przeciwwskazania

Leku Viagra Connect Max nie należy przyjmować w przypadku:

- uczulenia na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- braku problemów z erekcją, gdyż lek ten nie będzie miał wówczas żadnego korzystnego działania,
- przyjmowania leków zwanych azotanami (nitrataми) w celu łagodzenia bólu w klatce piersiowej lub w leczeniu niewydolności serca,
- przyjmowania leku riociguat (lub inne leki pobudzające cyklazę guanylową) stosowanego w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi w płucach,
- przyjmowania leku rytonawir stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIV,
- gdy lekarz polecił pacjentowi unikanie aktywności seksualnej, np. z powodu problemów z sercem lub naczyniami krwionośnymi,
- ciężkiej choroby serca, takiej jak: niedawno przeżyty zawał serca lub udar mózgu (przeżyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy), niestabilna dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej) lub ciężka niewydolność serca (zmniejszona zdolność serca do pompowania krwi),
- ciężkiej choroby wątroby,
- niskiego ciśnienia krwi (poniżej 90/50 mmHg),
- gdy wystąpiła kiedykolwiek poważna utrata wzroku z powodu uszkodzenia nerwu wzrokowego, taka jak przednia niedokrwienność nerwu

wzrokowego lub jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzoną chorobę oczu, taką jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki,

- gdy występuje deformacja anatomiczna prącia,
- gdy pacjent nie ma skończonych 18 lat.

Działania niepożądane

- Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
- Często (może występować u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
- Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkanie nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
- Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

- Należy omówić zastosowanie leku Viagra Connect Max jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowata, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroba wrzodowa, zaburzenia krzepnięcia oraz zaburzenia czynności nerek i wątroby.
- W przypadku nagłego pogorszenia lub utraty wzroku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Viagra Connect Max zawiera laktozę.

Producent

UPJOHN EESV
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel Holandia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943