

Vicks AntiGrip Max 1000 mg + 16 mg + 4 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek



Cena: 36,93 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VICKS
Opakowanie	10 saszetek
Postać	granulki
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwożarączkowe, Przeciwozbręzkowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Vicks AntiGrip Max to lek w formie granulatu do przygotowania roztworu doustnego. Zawiera trzy substancje czynne: paracetamol, fenylefrynę i chlorfenaminę. Każda saszetka dostarcza 1000 mg paracetamolu, który działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, 16 mg fenylefryny zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, oraz 4 mg chlorfenaminy, przeciwhistaminowej substancji redukującej wydzielinę z nosa.

Wskazania

Leczenie objawów przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Działanie

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, zmniejszające obrzęk błony śluzowej nosa, zmniejszające ilość wydzieliny z nosa.

Dawkowanie

Dorośli: jedna saszetka co 6-8 godzin.

Skład

1 saszetka zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 1000 mg, fenylefryny wodorowinian 16 mg, chlorfenaminy maleinian 4 mg,
- substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.

Przeciwwskazania

- Nadciśnienie tętnicze.
- Nadczynność tarczycy.
- Ciężka choroby sercowo-naczyniowa.
- Tachykardia.
- Ciężka niewydolność nerek.
- Jaskra.
- Ciężka niewydolność wątroby.
- Leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu.
- Wiek poniżej 18 roku życia (nie należy stosować u dzieci i młodzieży).
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób na 100 pacjentów):

- Senność, nudności i osłabienie mięśniowe (które mogą ustąpić po 2-3 dniach leczenia),
- mimowolne ruchy mięśni twarzy, zaburzenia koordynacji, uczucie mrowienia i drętwienia lub zmian temperatury skóry, drżenia,
- suchość w jamie ustnej, jadłowstręt, zmiany czucia smaku, i zapachu,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe mogące ulec zmniejszeniu przy stosowaniu leku łącznie z pokarmem (np. nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu),
- zatrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu,
- suchość błony śluzowej nosa i gardła, wysychanie błon śluzowych,
- nasilona potliwość,
- niewyraźne i podwójne widzenie.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000) lub rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000) występujące działania niepożądane:

- pobudzenie nerwowe (objawiające się niepokojem, bezsennością, drżeniem, majaczeniem, kołataniem serca a także drgawkami) lub zmęczenie,

ucisk w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie akcji serca (na ogół przy przedawkowaniu), obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego,

- cholestaza, zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby (łącznie z bólami brzucha, ciemnym zabarwieniem moczu),
- ciężkie reakcje alergiczne,
- nadwrażliwość na światło,
- krzyżowa alergia na leki podobne do chlorfenaminy,
- zmiany w morfologii krwi,
- bóle gardła, obrzęki (opuchlizna), szumy uszne, ostre zapalenie błędnika (część ucha),
- impotencja,
- krwawienia międzymiesiączkowe.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych,
- zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa,
- obrzęk płuc i krwawienie domózgowe (na ogół przy stosowaniu dużych dawek).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- Zaburzenia krwi takie jak: trombocytopenia, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna,
- hipoglikemia,
- zaburzenia ze strony nerek, mętny mocz,
- alergiczne zapalenie skóry,
- wstrząs anafilaktyczny,
- żółtaczkę.

Częstość nieznana:

- niepokój, lękliwość,
- osłabienie, drażliwość, bezsenność,
- nudności, drżenia,
- ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, ciężka bradykardia (bardzo powolne bicie serca),
- skurcz naczyń krwionośnych, zwiększenie wysiłku mięśnia sercowego (co wpływa szczególnie na pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z

zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego), chłodne dłonie i stopy, zaczerwienienie,

- trudności z oddychaniem, duszność,
- pogorszenie ukrwienia nerek, zmniejszenie ilości moczu i zatrzymanie moczu,
- bladość skóry, stroszenie włosów,
- hiperglikemia (zwiększone stężenie cukru we krwi),
- hipokaliemia (zbyt niskie stężenie potasu w surowicy), kwasica metaboliczna.
- Przy stosowaniu dużych dawek mogą pojawić się: bóle głowy, drgawki, stany psychiatryczne z omamami, wymioty.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować więcej niż jednego leku zawierającego paracetamol, ponieważ może to prowadzić do zatrucia.
- Nie należy stosować jednocześnie sympatykomimetyków oraz leków przeciwhistaminowych.
- Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą alkoholową i pacjentów regularnie pijących alkohol i nie podawać więcej niż 2 saşetek leku na dobę.
- Przed przyjęciem leku pacjenci z niedokrwistością, chorobami serca, płuc i zaburzeniami czynności wątroby powinni zasięgnąć porady lekarza. W ich wypadku dozwolone jest stosowanie sporadyczne.
- Zgłaszano przypadki toksycznego działania na wątrobę w sytuacji, gdy paracetamol podany był w dobowej dawce nieprzekraczającej 4 g.

Producent

WICK PHARMA
Sulzbacher Str. 40-50, Niemcy
Schwalbach am Taunus