

Vicks Antigrip Zatoki i Katar, granulki do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek

Cena: 36,79 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VICKS
Opakowanie	10 saszetek
Postać	granulki
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Przeznaczenie	Gorączka, Katar, Zatoki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Saszetki Vicks AntiGrip Zatoki i Katar to lek na objawy przeziębienia i grypy, zawierający trzy składniki aktywne: paracetamol, który obniża temperaturę i łagodzi ból, oraz chlorfenaminę i fenylefrynę, które ułatwiają oddychanie. Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Wskazania

Wskazanie do zastosowania saszetek Vicks Antigrip stanowi leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni), obrzękiem błony śluzowej nosa z tworzeniem wydzieliny.

Działanie

Za działanie leku Vicks Antigrip odpowiadają trzy substancje czynne znajdujące się w jego składzie. Fenylefryna i chlorfenamina skupiają swoje działanie w okół nosa. Fenylefryna obkurcza naczynia w błonie śluzowej, niwelując tym samym obrzęk i ułatwiając przepływ powietrza czyli oddychanie. Chlorfenamina zmniejsza produkcję śluzowej wydzieliny. Działanie leku uzupełnia paracetamol dzięki swoim przeciwozapalczowym i przeciwbólowym właściwościom.

Dawkowanie

Dorośli: 1 saszetka co 4-6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini hydrogenotartras) i chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas).

- 1 saszetka zawiera 650 mg paracetamolu, 16 mg fenylefryny, 4 mg chlorfenaminy.
- Substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Vicks Antigrip Zatoki i Katar jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest również: nadciśnienie tętnicze; nadczynność tarczycy; jakąkolwiek ciężka choroba serca lub tętnic (taką jak choroba wieńcowa); tachykardia (zbyt szybkie bicie serca); ciężka niewydolność nerek; jaskra; ciężka niewydolność wątroby;

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób): senność; osłabienie mięśniowe (które mogą ustąpić po 2-3 dniach leczenia), mimowolne ruchy mięśni twarzy, zaburzenia koordynacji, uczucie mrowienia i drętwienia lub zmian temperatury skóry, drżenia; suchość w jamie ustnej, jadłowstręt, zmiany czucia smaku, i zapachu; dolegliwości żołądkowo-jelitowe mogące ulec zmniejszeniu przy stosowaniu leku łącznie z pokarmem (np. nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu); zatrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu; suchość błony śluzowej nosa i gardła; wysychanie błon śluzowych; nasilona potliwość; niewyraźne i podwójne widzenie.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób) lub rzadko (częściej niż u 1 na 10000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób): Pobudzenie nerwowe (objawiające się niepokojem, bezsennością, drżeniem, majaczeniem, kołataniem serca a także drgawkami) lub zmęczenie; ucisk w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie akcji serca (na ogół przy przedawkowaniu), obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego; cholestaza, zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby (łącznie z bólami brzucha, ciemnym zabarwieniem moczu); ciężkie reakcje alergiczne (kaszel, trudności z połykaniem, świąd, opuchnięcie powiek lub okolicy oczu, twarzy i/lub języka, duszność, zmęczenie itp.); nadwrażliwość na światło; niedociśnienie lub nadciśnienie; krzyżowa alergia na leki podobne do chlorfenaminy; zmiany w morfologii krwi; bóle gardła; obrzęki (opuchlizna); szumy uszne, ostre zapalenie błędnika (część ucha); impotencja; krwawienia międzymiesiączkowe.
- Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób): Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa; obrzęk płuc; krwawienie domózgowe (na ogół przy stosowaniu dużych dawek).
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10000 osób): zaburzenia krwi takie jak: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów -jednego z rodzajów białych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), niedokrwistość hemolityczna, hipoglikemia (znaczne zmniejszenie stężenia cukru we krwi); zaburzenia ze strony nerek, mętny mocz; alergiczne zapalenie skóry; wstrząs anafilaktyczny; żółtaczka.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):ciężka bradykardia (bardzo powolne bicie serca), skurcz naczyń krwionośnych,zwiększenie wysiłku mięśnia sercowego (co wpływa szczególnie na pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego), chłodne dłonie i stopy, zaczerwienienie, trudności z oddychaniem, duszność, bledność skóry, stroszenie włosów, hiperglikemia (zwiększone stężenie cukru we krwi), hipokaliemia (zbyt niskie stężenie potasu w surowicy), kwasica metaboliczna.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera paracetamol. Nie należy stosować innych leków zawierających paracetamol. Paracetamol może uszkadzać wątrobę.
- W czasie leczenia nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.
- U pacjentów z niedokrwistością, chorobami serca, płuc i zaburzeniami czynności wątroby dozwolone jest stosowanie sporadyczne, należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.
- Pacjenci chorujący na astmę uczuleni na kwas acetylosalicylowy powinni zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.
- Pacjenci wrażliwi na działanie leków uspokajających oraz pacjenci z padaczką powinni zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ może dojść u nich do nasilenia objawów choroby oraz wystąpienia interakcji z lekami stosowanymi do leczenia tych chorób.
- W przypadku : choroby nerek i płuc, rozrost gruczołu krokowego, cukrzyca, astma oskrzelowa, bardzo wolne bicie serca, hipotonia (zbyt niskie ciśnienie krwi), miażdżycy naczyń mózgowych, zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka, zwężenie połączenia odzwiernika i dwunastnicy, choroby tarczycy, niedokrwistość, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej należy się skontaktować z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Producent

Wick - Pharma - Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Procter & Gamble 65823 Schwalbach/Ts.
65823 Schwalbach/Ts., Germany