

Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy, 20 mg/15 ml, syrop, 120 ml

Cena: 17,94 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Vicks MedDex to miodowy syrop przeznaczony do łagodzenia suchego i uporczywego kaszlu.

Wskazania

Vicks MedDex stosuje się do leczenia suchego, drażniącego, nieproduktywnego kaszlu.

Działanie

Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo poprzez hamowanie odruchu kaszlu. W dawkach terapeutycznych nie hamuje aktywności nabłonka rzęskowego.

Dawkowanie

Młodzież w wieku powyżej 14 lat i dorośli:

- 15 ml 3 razy na dobę.
- Maksymalna dawka dobową wynosi 45 ml.
- Lek należy przyjmować doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć butelką.

Skład

- Substancją czynną jest dekstrometorfanu bromowodorek.
- 15 ml syropu zawiera 20 mg dekstrometorfanu bromowodorku.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, sacharyna sodowa, glikol propylenowy, etanol 96%, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy bezwodny, karboksymetyloskrobia sodowa, polietylenu tlenek, aromat miodu L-166952 (zawierający glikol propylenowy, miód, aromat miodu, karmel, disodu edetynian (EDTA), wodę oczyszczoną), mentoksypropanediol (TK 10),

makrogolu stearynian, sodu benzoesan (E 211), aromat wiułki, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vicks MedDex o smaku miodu:

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dekstrometorfanu bromowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vicks MedDex o smaku miodu.
- Jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc), zapalenie płuc, zahamowanie czynności układu oddechowego (depresja oddechowa), zaburzenia oddychania (niewydolność oddechowa).
- Podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków poprawiających nastrój (inhibitory MAO).
- U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- Reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne lub wstrząs anafilaktyczny, obrzęk jamy ustnej i gardła. Po pierwszych objawach reakcji nadwrażliwości, NIE należy ponownie przyjmować leku. Należy poinformować lekarza.
- Umiarkowane zmęczenie, zawroty głowy.
- Nudności, problemy żołądkowo-jelitowe, wymioty.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- Wysypki skórne.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- Senność, omamy, rozwój uzależnienia, jeśli lek jest nadużywany

Ostrzeżenia

- Jeśli u pacjenta występuje kaszel z wytwarzaniem znaczącej ilości śluzu (z odkrztuszaniem), powinien stosować ten lek tylko po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ w takich okolicznościach hamowanie kaszlu może być niepożądane.
- Przewlekły kaszel może być wczesnym objawem astmy oskrzelowej. Ten lek jest zatem niewskazany w hamowaniu takiego kaszlu, szczególnie u dzieci.
- Należy wziąć pod uwagę, iż ten lek może prowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależniania się od leków, ten lek powinien być stosowany przez krótki okres i pod ścisłą kontrolą lekarza.
- Lek zawiera 5% (v/v) alkoholu. Jeśli lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami, z każdą dawką przyjmuje się 0,63 g alkoholu (na 15 ml).
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

WICK PHARMA
Sulzbacher Str. 40-50, Niemcy
Schwalbach am Taunus