

Vicks Sinex Aloes i Eukalip. aerozol 15 ml



Cena: 34,95 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VICKS
Opakowanie	15 ml
Postać	Aerozol
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Przeznaczenie	Katar, Zatoki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus to lek w postaci aerozolu, który jest stosowany miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa, które występują w przebiegu przeziębienia lub zapalenia błony śluzowej nosa. Jego substancją czynną jest oksymetazolina chlorowodrek, który działa bezpośrednio na receptory naczyń krwionośnych nosa i zatok przynosowych. Dzięki temu zmniejsza obrzęk i przekrwienie tych obszarów, co ułatwia oddychanie. Działanie leku pojawia się już po kilku minutach i utrzymuje się przez około 12 godzin.

Lek Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Wskazania

Miejscowo w łagodzeniu objawów niedrożności nosa występującej w przeziębieniu lub zapaleniu zatok.

Działanie

Udrożniające nos oraz zmniejszające obrzęk i przekrwienia błon śluzowych nosa.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego nie częściej niż 2-3 razy na dobę.
- Dzieci w wieku 6-10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego nie częściej niż 2-3 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: oksymetazolinę chlorowodorek 0,5 mg,
- pozostałe składniki: sorbitol, cytrynian sodu dwuwodny, tyloksapol, diglukonian chloroheksydyny; roztwór, kwas cytrynowy bezwodny, chlorek benzalkoniowy, roztwór; acesulfam potasowy, L-mentol, cyneol, edetynian disodu dwuwodny, suchy wyciąg z aloesu, L-karwon, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenia (nadwrażliwości) na chlorowodorek oksymetazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Stosowania (obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni) inhibitorów monoaminoooksydazy.
- Ciężkiej choroby serca lub duszności w przebiegu niewydolności serca.
- Podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej (jaskry z wąskim kątem przesączania).
- Zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa lub obecności strupów w nosie.

Działania niepożądane

- kichanie,
- suchość i podrażnienie w nosie, jamie ustnej lub gardle.
- niepokój, zmęczenie, rozdrażnienie, zaburzenia snu,
- przyspieszony rytm serca, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi,
- zatkały nos, obrzęk błony śluzowej nosa, ból głowy,
- nudności,

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ostrzeżenia

Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku pacjentów cierpiących na:

- wysokie ciśnienie krwi,
- dławicę piersiową,
- cukrzycę,
- zaburzoną czynność tarczycy,
- rozrost gruczołu krokowego.