

# Vicks SymptoMed saszetek 10 sasz pomarańcza



Cena: 26,31 zł

## Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VICKS
Opakowanie	10 saszetek
Postać	granulki
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Przeznaczenie	Gorączka, Katar, Zatoki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Vicks AntiGrip to lek przeznaczony dla dorosłych, dostępny w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego o smaku pomarańczowym. Jego zastosowanie polega na łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy. Skład leku Vicks saszetki obejmuje trzy substancje czynne:

- Paracetamol - działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, co pomaga w obniżeniu gorączki oraz łagodzeniu bólu.
- Fenylefryna - działa na receptory naczyń krwionośnych nosa i zatok przynosowych, co skutkuje zmniejszeniem obrzęku błony śluzowej, ułatwiając oddychanie.
- Chlorfenamina - jest substancją przeciwhistaminową, która zmniejsza ilość wydzieliny z nosa, co przyczynia się do łagodzenia przekrwienia i zatkania nosa.

Dzięki tym składnikom, Vicks AntiGrip pomaga złagodzić objawy przeziębienia i grypy, takie jak gorączka, ból głowy, zatkanie nosa i kichanie. Lek ten służy do krótkotrwałego, objawowego leczenia i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami oraz bez przekraczania zalecanej dawki.

### Wskazania

Leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni, zatok przynosowych), obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z tworzeniem wydzieliny.

### Działanie

Przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, zmniejszające obrzęk błony śluzowej nosa, zmniejszające ilość wydzieliny z nosa.

### Dawkowanie

Dorośli: 1 saszетка co 4-6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

#### Skład

1 saszетка zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 650 mg, fenylefryny wodorowinian 16 mg, chlorfenaminy maleinian 4 mg,
- substancje pomocnicze: mannitol, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958.

#### Przeciwwskazania

Przyjmowanie leku Vicks AntiGrip jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- Uczulenie na substancje czynne leku lub na którykolwiek z pozostałych składników.
- Nadciśnienie tętnicze.
- Nadczynność tarczycy.
- Ciężka choroba serca lub tętnic, np. choroba wieńcowa.
- Tachykardia, czyli zbyt szybkie bicie serca.
- Ciężka niewydolność nerek.
- Jaskra.
- Ciężka niewydolność wątroby.
- Pacjent leczony lekiem z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), takimi jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, oraz w okresie 15 dni po odstawieniu tych leków.

#### Działania niepożądane

Niektóre z możliwych skutków ubocznych stosowania tego leku mogą obejmować:

- Senność, nudności i osłabienie mięśni, które mogą ustąpić po kilku dniach leczenia.
- Mimowolne ruchy mięśni twarzy, zaburzenia koordynacji, uczucie mrowienia i drętwienia lub zmiany temperatury skóry, drżenia.
- Suchość w jamie ustnej, jadłowstręt, zmiany czucia smaku i zapachu.
- Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu, które mogą być zmniejszone przy jednoczesnym przyjmowaniu leku z pokarmem.
- Zatrzymanie moczu i trudności z oddawaniem moczu.
- Suchość błony śluzowej nosa i gardła, co może powodować ich wysychanie.
- Nasiloną potliwość, niewyraźne i podwójne widzenie.

#### Ostrzeżenia

- Lek zawiera paracetamol. Nie należy stosować innych leków zawierających paracetamol. Paracetamol może uszkadzać wątrobę.
- W czasie leczenia nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.
- U pacjentów z niedokrwistością, chorobami serca, płuc i zaburzeniami czynności wątroby dozwolone jest stosowanie sporadyczne, należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.
- Pacjenci chorujący na astmę uczuleni na kwas acetylosalicylowy powinni zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku.
- Pacjenci wrażliwi na działanie leków uspokajających oraz pacjenci z padaczką powinni zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ może dojść u nich do nasilenia objawów choroby oraz wystąpienia interakcji z lekami stosowanymi do leczenia tych chorób.