

VIDISIC Żel do oczu 2mg/g, 10g Delfarma

Cena: 18,78 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 g (tub.)
Postać	żel do oczu
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Vidisic to lek w postaci płynnego żelu do oczu, który ma na celu zastąpienie naturalnych łez w przypadku problemów z ich wydzielaniem. Używa się go do łagodzenia objawów zespołu suchego oka, znanego również jako suche zapalenie rogówki i spojówek. Żel zawiera karbomer, który wiąże wodę, zapewniając tym samym odpowiednie nawilżenie spojówek i rogówek.

Wskazania

Lek Vidisic jest stosowany w objawowym leczeniu zespołu suchego oka (zwanego także suchym zapaleniem rogówki i spojówek).

Działanie

Działanie żelu polega na wiązaniu wody przez karbomer, przez co na powierzchni oka powstaje przezroczysta warstwa ochronna, która nawilża rogówki jak również spojówki. Karbomer to wielkocząsteczkowy związek o właściwościach zbliżonych do naturalnych łez, tzn. posiada dużą lepkość i fizjologiczne pH.

Dawkowanie

Dawkowanie w leczeniu zespołu suchego oka zależy od stanu indywidualnego pacjenta. Krople należy podawać do worka spojówkowego 3 do 5 razy na dobę lub w zależności od potrzeb częściej oraz około 30 minut przed snem (w przeciwnym razie istnieje ryzyko sklejenia powiek). Należy konsultować się z lekarzem okulistą w trakcie stosowania produktu Vidisic w leczeniu zespołu suchego oka, które zazwyczaj wymaga długotrwałego lub ciągłego leczenia.

Skład

- Substancją czynną leku jest karbomer (Carbomerum).
- Substancje pomocnicze: cetrymid, sodu wodorotlenek, sorbitol, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Nie stosować Vidisic u osób uczulonych na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.



Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób): pieczenie oczu, zaczerwienienie oczu, wyprysk na powiece, uczucie obecności ciała obcego w oku, olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek, świąd oczu, uczucie lepkości w oku, powierzchniowe punktowe zapalenie rogówki, łzawienie, niewyraźne widzenie.

Ostrzeżenia

- Jeśli objawy zespołu suchego oka utrzymują się lub nasilają się, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Vidisic jest produktem jałowym do pierwszego otwarcia i ważne, aby utrzymywać opakowanie oraz sam lek w czystości.

- Pacjenci noszący soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku powinni je zdjąć. Po aplikacji żelu, soczewki można założyć po minimum 15 minutach.
- Lek Vedisic zawiera cetrimid jako środek konserwujący, który stosowany często lub przez długi okres czasu może powodować podrażnienie oka (pieczenie, przekrwienie, uczucie obecności ciała obcego) i może uszkadzać nabłonek rogówki. Jeśli wystąpią powyższe działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Vedisic i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy zalecą stosowanie innych leków, niezawierających środków konserwujących.

Producent

DR MANN PHARMA