

Vigalex Forte 2000 IU, 60 tabletek

Cena: 32,30 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VIGALEX
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomaganie odporności, Wzmacniające, Wzmocnienie kości
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Vigalex Forte to lek z witaminą D3 w formie cholekalcyferolu. Dostępny jest w postaci małych, łatwych do połknięcia tabletek, z każdą tabletką zawierającą 2000 IU substancji czynnej. Tabletki Vigalex Forte nie zawierają żelatyny, dzięki czemu są odpowiednie dla osób na diecie wegetariańskiej.

Wskazania

Lek Vigalex Forte 2000 IU stosuje się pacjentów w wieku od 6 lat z prawidłową masą ciała:

- aby zapobiec niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,
- w profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem,
- zapobiegawczo w krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
- wspomagająco w leczeniu osteoporozy u dorosłych.

Działanie

Zapobieganie niedoborom witaminy D3.

Dawkowanie

Młodzież od 11 do 18 lat z prawidłową masą ciała

- zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę
- zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę

Dorośli z prawidłową masą ciała

- zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę
- zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę
- leczenie wspomagające osteoporozy: 2000 do 4000 IU na dobę

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: cholekalcyferol 20 mg, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3),
- pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana, kukurydziana, krospowidon (typ A), sacharoza, magnezu stearynian, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac- α -Tokoferol.

Przeciwwskazania

- Kamica nerkowa lub ciężką niewydolność nerek.
- Gdy występuje uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tych leków.
- Jeśli występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) lub hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem).
- W przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka,
- nadwrażliwości skórne: świąd skóry, wysypka lub pokrzywka;
- w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi) i hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem). W pojedynczych przypadkach opisywano zejścia śmiertelne.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania produktu należy zasięgnąć opinii lekarza, szczególnie, gdy pacjent przyjmuje inne produkty zawierające witaminę D, ma sarkoidozę, zaburzenia czynności nerek, przyjmuje glikozydy nasercowe lub leki moczopędne, a także jeśli leczenie jest długotrwałe (powyżej 3 miesięcy).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję różnych cukrów przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, gdyż w składzie znajduje się sacharoza.
- Lek, w zalecanej jednostce dawkowania zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), co oznacza, że jest on wolny od sodu.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań