

Vigantol krople 10 ml



Cena: 24,24 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VIGANTOL
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Krople
Producent	P & G HEALTH GERMANY GMBH
Przeznaczenie	Krzywica, Niedobór witamin, Osteoporoza
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 1 dnia życia

Opis produktu

Opis

Vigantol 20 000 IU to lek w formie kropli doustnych, zawiera aktywny składnik - witaminę D (cholekalcyferol), który odgrywa rolę w procesie formowania kości. Witamina D3 (cholekalcyferol) może być dostarczana do organizmu za pomocą pokarmu lub syntezę w organizmie pod wpływem działania promieniowania UV. Niedobory witaminy D mogą wskazywać na zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utraty wapnia z kości (osteomalacja).

Lek Vigantol 20 000 IU znajduje zastosowanie w prewencji krzywicy, osteomalacji oraz w uzupełnianiu niedoborów witaminy D. Dodatkowo, może być stosowany wspomagająco w terapii osteoporozy. Produkt jest równy dla różnych grup wiekowych, w tym dla noworodków (w tym wcześniaków), dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Butelka leku Vigantol 20000 IU posiada praktyczną zakrętkę z kropłomierzem, ułatwiającą uzupełnienie odmierzanie dawki.

Wskazania

Vigantol stosuje się w:

- zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
- zapobieganiu krzywicy u wcześniaków,
- zapobieganiu schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,
- zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,
- leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

Działanie

Witamina D3 dostarcza właściwości, m.in. Regulacja między mechanizmem wapniem a fosforanami, zwiększenie absorpcji wapnia i fosforanów w przewodzie pokarmowym, wpływ na mineralizację kości oraz jest niezbędny do obsługi działania mięśni oraz mechanizmu działania. Niedobory witaminy D3 mogą świadczyć o rozwoju krzywicy, zaburzeniach procesu mineralizacji kości, osteoporozy oraz osłabieniu funkcji układu immunologicznego.



Dawkowanie

- **Noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca):** zaleca się podawać 1 kroplę na dobę (co odpowiada 500 IU witaminy D).

U wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.

- **Dzieci i młodzież:** 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3).
- **Dorośli i osoby w podeszłym wieku:** 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: cholekalcyferol 500 µg,
- pozostałe składniki: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem są także zbyt duże stężenia wapnia w krwi, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, kamica nerkowa lub ciężka niewydolność nerek oraz rzekoma niedoczynność przytarczyc.

Działania niepożądane

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka. Reakcje nadwrażliwości, takie jak: świąd skóry, wysypka lub pokrzywka.

Ostrzeżenia

- Vigantol zachowuje ważność przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

P&G Health Germany GmbH
Sulzbacher Strasse 40
65824 Schwalbach am Taunus
Niemcy