

Vitaminum A+E Medana, 2500 j.m.A + 200 mg E, kapsułki, 20 kapsułek

Cena: 7,13 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MEDANA
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Niedobór witamin
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Vitaminum A+E Medana to lek stosowany w niedoborach witamin A i E, który pomaga w przypadku zaburzeń przemiany materii, niedowidzenia zmierzchowego, problemów z odpornością oraz zmian chorobowych nabłonek i błon śluzowych.

Wskazania

Leczenie niedoborów witaminy A i witaminy E objawiających się:

- niedowidzeniem zmierzchowym;
- zaburzeniami wzrostu;
- długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem;
- zaburzeniami w przemianie materii;
- zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia;
- zmianami chorobowymi nabłonek i błon śluzowych.

Leczenie wspomagające:

- w chorobach układu krążenia (chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, zakrzepowym zapaleniu żył);
- w profilaktyce chorób, których etiologia związana jest z „wolnymi rodnikami” np. miażdżyca, choroba niedokrwiennej serca, nowotwory, szczególnie u osób

przebywających w skażonym środowisku, narażonych na stres lub u palaczy;

- w profilaktyce miażdżycy naczyń;
- w retinopatii miażdżycowej i nadciśnieniowej;
- w niedokrwistości hemolitycznej;
- w cukrzycy;
- w kolagenozach.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 15 lat i dorośli (profilaktycznie): 1-2 kapsułki dziennie.

Skład

- Substancjami czynnymi są: palmitynian retinolu (Retinoli palmitas) i all-rac- α -tokoferylu octan (int-rac- α -Tocopherylis acetas).
- 1 kapsułka zawiera 2500 IU palmitynianu retinolu i 200 mg all-rac- α -tokoferylu octanu.
- Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum A + E Medana:

- jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę A lub E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień);
- jeśli pacjent ma zespół złego wchłaniania ze stolcami woskowymi;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność lub marskość wątroby;
- jeśli pacjent ma niedrożność dróg żółciowych;
- jeśli pacjent przeszedł zespolenie jelita czczego z krętym;
- jeśli pacjentka karmi piersią.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (dotyczy przyjmowania powyżej 4 kapsułek na dobę):

- biegunka, bóle brzucha, nudności, inne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego,
- osłabienie mięśniowe, bóle głowy, nieostre widzenie, uczucie zmęczenia.

Ostrzeżenia

- Lek należy stosować ostrożnie w przypadku stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych lub estrogenów.
- Należy zachować ostrożność stosując ten lek u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz