

Vitaminum B compositum, tabletki drażowane, 50 drażetek

Cena: 7,31 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Niedobór witamin
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Vitaminum B compositum to wielowitaminowy lek stosowany do profilaktyki i leczenia niedoborów witamin z grupy B, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Wskazania

- Profilaktyka i leczenie niedoborów witamin z grupy B, która mogą wystąpić w wyniku: zwiększonego zapotrzebowania (gorączka, oparzenie, alkoholizm, ciąża i karmienie piersią, choroby przewlekłe i wyniszczające, rekonwalescencja, schorzenia żołądkowo-jelitowe z zaburzeniami wchłaniania witamin, zaburzenia trawienia).
- Pomocniczo w chorobach układu nerwowego,
- W stanach zapalnych błon śluzowych (war, jamy ustnej, czyraczność, trądzik).

Działanie

Produkt wielowitaminowy zawierający zestaw witamin z grupy B niezbędnych w prawidłowym przebiegu procesów przemiany materii. Witaminy zawarte w produkcie uczestniczą w wielu procesach zachodzących w organizmie na poziomie komórkowym - w oddychaniu tkankowym i przemianie mediatorów ośrodkowego układu nerwowego.

Dawkowanie

- Dorośli: 3-5 razy na dobę po 1 tabletkę.
- Dzieci: 1-3 razy na dobę po 1 tabletkę.

Skład

- Substancjami czynnymi są: tiaminy azotan (B1), ryboflawina (B2), pirydoksyny chlorowodorek (B6), nikotynamid (PP), wapnia pantoteinian (B5).
- 1 tabletkę drażowaną zawiera 3 mg witaminy B1, 5 mg witaminy B2, 5 mg witaminy B6, 40 mg witaminy PP, 5 mg wapnia



pantoteinianu.

- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, powidon K-25, talk, magnezu stearynian, sacharoza, karmeloza sodu, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, polisorbat 80, tytanu dwutlenek, talk, lak żółcieni pomarańczowej (E110), воск Capol.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B compositum:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub pozostałe składniki tego leku.

Działania niepożądane

- Zaczerwienienie skóry, rumień twarzy, wysypka, pokrzywka,
- Osłabienie, bóle głowy, drażliwość, bezsenność, przyspieszenie akcji serca,
- Biegunka.

Ostrzeżenia

- Witaminy z grupy B są rozpuszczalne w wodzie, nie kumulują się w organizmie, ponieważ nadmierne ilości są wydalone w moczu.
- Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z hiperkalcemią, kamicą układu moczowego, niewydolnością nerek.
- Lek zawiera laktozę i sacharozę.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa