


Vitaminum E Medana, 200 mg, kapsułki elastyczne, 20 kapsułek

Cena: 8,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Niedobór witamin
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Vitaminum E Medana to lek stosowany w leczeniu niedoboru witaminy E, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wskazania

Leczenie niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem się oraz zaburzeniami przemiany materii. Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.

Działanie

Substancja czynna leku - witamina E jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, który chroni przed szkodliwym działaniem nadmiernych ilości związków o silnych właściwościach utleniających oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Ochrona przed uszkodzeniem przez rodniki tlenowe wydaje się istotna w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego oraz mięśniowego. Witamina E może także działać jako kofaktor w niektórych układach enzymatycznych (składnik niezbędny w pewnych procesach przemiany materii).

Dawkowanie

Dorośli: 1 lub 2 kapsułki na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest all-rac- α -tokoferylu octan.
- Każda kapsułka zawiera 200 mg all-rac- α -tokoferylu octanu.
- Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, parahydroksybenzoesan etylu (E214), koszenila (E120), woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum E Medana:

- jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę E lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli występuje niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień).

Działania niepożądane

Dawki przekraczające 1200 mg na dobę mogą powodować wystąpienie takich objawów jak:

- ból głowy,
- zaburzenia ostrości widzenia,
- nudności,
- biegunka,
- wysypka,
- osłabienie,
- zmęczenie.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Ostrzeżenia

Vitaminum E Medana zawiera parahydroksybenzoesan etylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz