

Voltaren Acti Forte, 25 mg, tabletki powlekane, 20 tabletek

Cena: 34,42 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VOLTAREN
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Voltaren Acti Forte to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w postaci tabletek powlekanych. Zawiera diklofenak potasu, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Voltaren Acti Forte jest stosowany przy bólu mięśni, w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, zębów oraz przy bólach menstruacyjnych. Można go również stosować w objawach grypy lub przeziębienia ze względu na działanie przeciwgorączkowe.

Wskazania

Voltaren Acti Forte stosuje się w bólu mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnego miesiączkowania. Lek można podawać również w leczeniu objawów grypy i przeziębienia (ból, gorączka), bólu gardła.

Działanie

Voltaren Acti Forte łagodzi objawy stanu zapalnego takie jak ból i obrzęk poprzez blokowanie syntezy cząsteczek (prostaglandyn) odpowiedzialnych za stan zapalny, ból i gorączkę. Voltaren Acti Forte nie wpływa na przyczyny stanu zapalnego i gorączki.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: 1 dawka leku to 1 tabletkę, jeśli jest taka potrzeba kolejną tabletkę można przyjmować co 4 do 6 godzin.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak potasowy (Diclofenacum kalicum).
- 1 tabletkę powlekana zawiera 25 mg diklofenaku potasowego.
- Substancje pomocnicze: Rdzeń: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna

bezwodna, powidon, magnezu stearynian. Otoczką: sacharoza, talk, powidon, makrogol 8000, celuloza mikrokryształiczna, barwnik dispersed Red 16158 Anstead: żelaza tlenek (E 172), dwutlenek tytanu (E 171).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Voltaren Acti Forte:

- jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na diklofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały reakcje uczuleniowe po lekach stosowanych w leczeniu bólu, zapalenia lub gorączki, takich jak diklofenak,

ibuprofen lub kwas acetylosalicylowy (substancja stosowana także w celu zahamowania krzepnięcia krwi);

- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń;
- jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych);
- występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;
- występuje krew w stolcu lub czarne zabarwienie stolca (objawy wskazujące na krwawienia w przewodzie pokarmowym);
- występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby;
- u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): ból brzucha, ból żołądka, biegunka, nudności, wzdęcia, ból głowy, zawroty głowy, zaczerwienienie skóry.
- Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek): senność.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zaparcia, opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, zaburzenia smaku, mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, drżenie, zamazane widzenie, dzwonięcie w uszach, kołatanie serca, zmiany nastroju, trudności w zasypianiu, uczucie dezorientacji.

Ostrzeżenia

- Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę, gdy pacjent pali tytoń oraz jeśli choruje na: cukrzycę, dusznicę bolesną, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów.
- Stosowanie leków typu Voltaren Acti Forte może powodować większe ryzyko ataku serca czy udaru. Ryzyko to rośnie podczas długotrwałego przyjmowania dużych ilości leku. Tabletki Voltaren mogą maskować symptomy zakażenia, dlatego należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.
- Lek zawiera sacharozę, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Producent

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
mystory.pl@haleon.com

Galeria

